



Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Humant hepatit B-immunglobulin (HBIG), ska ej spädas

Injektionsflaska 1 mL innehåller 180 E

Injektionsflaska 3 mL innehåller 540 E

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion:

Låt lösningen anta rumstemperatur innan administrering.

Barn under 1 år: Ges i mellersta delen av lårets utsida (anterolaterala delen).

Barn från 1 år: Ges i övre tredjedelen av överarmens utsida (i deltoideusmuskeln).

Ges i annan kroppsdel än hepatit B-vaccinet.

Om mer än 2 mL ska ges bör dosen delas upp och administreras på olika ställen.

Lösningen ska vara klar, färglös eller ljusgul till ljusbrun. Under förvaring kan lösningen bli något grumlig eller innehålla små mängder av partiklar. Grumligheten och/eller partiklarna ska försvinna av sig själv när lösningen antagit rumstemperatur, i annat fall ska lösningen kasseras.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Umanbig (registrerad produkt)

180 E/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp i ytterkartongen, ljuskänsligt. Öppnad flaska används direkt, får ej sparas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hepatit B-immunglobulin ges alltid i kombination med hepatit B-vaccin.

Post-expositionsprofylax, nyfödd till moder med hepatit B

Dos: 180 E (1 mL), ges snarast efter förlösningen, helst inom 12 tim

Prematurfödda före vecka 34 eller födelsevikt under 2000 g:

Immunglobulin GES ALLTID, oavsett moderns status. Vid graviditetslängd kortare än 24 v ges ytterligare en dos efter 1 månad.

Fullgångna nyfödda:

Immunglobulin GES I DE FALL modern har hög smittsamhet (HBeAg-positiv), akut pågående hepatit B eller nedsatt immunförsvar.

Post-expositionsprofylax till icke-immuniserad patient då expositionen bedöms medföra hög risk för smittöverföring

Nyfödda: 180 E (1 mL)

Barn 1 mån - 4 år: 180 E (1 mL)

Barn 5 - 9 år: 270 E (1,5 mL)

Barn 10 - 18 år: 540 E (3 mL)

Ges snarast möjligt efter exponering, helst inom 12 - 48 tim, men inte senare än 7 dagar.





Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig)

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer om vaccination mot hepatit B

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/?pub=56936>

Internetadress INFPREG - Kunskapscentrum för infektioner under graviditet: Hepatit B

<https://www.medscinet.se/infpreg/healthcareinfoMore.aspx?topic=14>

Internetadress RAV, Referensgruppen för antiviral terapi - Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn

<https://www.sls.se/rav/rekommendationer/hepatit-b-virus/>

Internetadress Vårdgivarguiden Region Stockholm - Handläggning av gravid kvinna med hepatit B och hennes barn

<https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/graviditet/handlaggning-av-gravid-kvinna-med-hepatit-b.pdf>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-03-23

ePedID: 1247

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-24

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-03-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT