



Klortiazid oralt 50 mg/mL

(Diuril licens) oral suspension

Förväxlingsrisk med HYDROklortiazid som är 10 gånger så potent jämfört med klortiazid

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Diuril oral suspension. Licenspreparat som är märkt 250 mg/5 mL (50 mg/mL).
Behöver ej spädas före administrering.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Suspensionen är gul och trögflytande. Ska skakas väl innan administrering.

Oralt

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Klortiazid oralt 50 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg	0,2 mL	1 mL	2 mL	10 mL
20 mg/kg	0,4 mL	2 mL	4 mL	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Diuril (licensprodukt)

50 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ödem/urindrivande

Bronkopulmonär dysplasi (BDP)

Nyfödda: 10 - 20 mg/kg x 2

Barn 1 - 23 mån: 10 - 20 mg/kg x 2, max 375 mg/dygn

Barn 2 - 11 år: 10 mg/kg x 2, max 1 g/dygn

Barn 12 - 18 år: 250 - 1000 mg x 1, alternativt 125 - 500 mg x 2, max 2 g/dygn

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress Drugs.com Diuril Dosage

<https://www.drugs.com/dosage/diuril.html>

Internetadress VGR, Alfresco - Läkemedel till nyfödda

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/38158?/a=false&guest=true>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

Summary of Product Characteristics (SPC) Diuril - chlorotiazide suspension

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-11-14

ePedID: 1282

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-12-11

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-12-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT