



## Nystatin oralt 100 000 E/mL

(ex Nystimex) oral suspension

### ADMINISTRERING

Skaka flaskan väl före användning.

Oralt:

Vid oral svampinfektion: Dosen fördelas på lesionerna (svampbeläggningarna) i munnen. Suspensionen kan appliceras med svabb. Alternativt ges suspensionen droppvis eller späds med vatten. Suspensionen ska hållas kvar i munnen så länge som möjligt innan den sväljs.

Vid intestinal svampinfektion: suspensionen sväljs direkt.

Födointag ska undvikas 5 - 10 min efter administrering. Förslagsvis bör suspensionen tas efter måltid.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Nystatin (Nystatin Orifarm) (registrerad produkt)

100000 E/mL, Oral suspension

Oöppnad flaska förvaras i rumstemperatur, kan även förvaras i kylskåp. Öppnad flaska förvaras i kylskåp eller rumstemperatur (max 25 °C), i högst 2 månad.

#### Nystatin (Nystimex) (registrerad produkt)

100000 E/mL, Oral suspension

Oöppnad flaska förvaras i kylskåp. Öppnad flaska förvaras i kylskåp eller rumstemperatur (max 25 °C), i högst 1 månad.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Oral och intestinal svampinfektion

Nyfödda: 1 mL x 4. Dosen kan ökas till 4 mL x 4

Barn 1 mån - 18 år: 1 mL x 4. Dosen kan ökas till 6 mL x 4

Vid oral svampinfektion fördelas dosen på lesionerna (svampbeläggningarna) i munnen.

Behandlingstid: fortsatt behandlingen 2 - 3 dagar efter att symtomen försvunnit, vanligen 1 - 2 veckor.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 1321

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-05-31

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**