



Nystatin oralt 100 000 E/mL

(ex Nystimex) oral suspension

ADMINISTRERING

Skaka flaskan väl före användning.

Oralt:

Vid ORAL svampinfektion: Dosen fördelas på lesionerna (svampbeläggningarna) i munnen.

Suspensionen kan ges droppvis alternativt spädas med vatten och penslas på lesionerna.

Suspensionen ska hållas kvar i munnen så länge som möjligt innan den sväljs.

Vid INTESTINAL svampinfektion: suspensionen sväljs direkt.

Födointag ska undvikas 5 - 10 min efter administrering.

Förslagsvis bör suspensionen tas efter måltid.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Nystatin (registrerad produkt)

100000 E/mL, Oral suspension

Nystimex/Nystafox/Nystatin Abacus: oöppnad flaska förvaras i kylskåp. Öppnad flaska förvaras i max 25 °C, hållbar 1 mån. Nystatin Orifarm: oöppnad flaska förvaras i kylskåp eller rumstemperatur. Öppnad flaska förvaras i max 25 °C, hållbar 2 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Oral och intestinal svampinfektion

Nyfödda: 1 mL x 4. Dosen kan ökas till 4 mL x 4.

Barn 1 mån - 18 år: 1 mL x 4. Dosen kan ökas till 6 mL x 4.

Behandlingstid: fortsatt behandlingen 2 - 3 dagar efter att symtomen försvunnit, vanligen 1 - 2 veckor.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 1321

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-11-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT