



Nystatin lokalt 100 000 E/mL

(ex Nystimex) oral suspension

INGEN SPÄDNING

ORAL SUSP
100000 E/mL
100 mL

ADMINISTRERING

Skaka flaskan väl före användning.

Lokalt:

Vid ORAL svampinfektion: Dosen fördelas på lesionerna (svampbeläggningarna) i munnen. Suspensionen kan ges droppvis alternativt spädas med vatten och penslas på lesionerna. Suspensionen ska hållas kvar i munnen så länge som möjligt innan den sväljs.

Mat, dryck och munhygien ska undvikas 30 minuter efter att dosen har administrerats då läkemedlet ska verka lokalt i munnen.

Vid INTESTINAL svampinfektion: suspensionen sväljs direkt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Nystatin (registrerad produkt)

100000 E/mL, Oral suspension

Nystimex/Nystafox/Nystatin Abacus/Nystatin Evolan: oöppnad flaska förvaras i kylskåp, öppnad flaska i max 25 °C, hållbar 1 mån, Evolan 2 mån. Nystatin Orifarm: oöppnad flaska förvaras i kylskåp el rumstemp., öppnad flaska i max 25 °C, hållbar 2 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Oral eller intestinal svampinfektion

Nyfödda: 1 mL x 4. Dosen kan ökas till 4 mL x 4.
Barn 1 mån - 18 år: 1 mL x 4. Dosen kan ökas till 6 mL x 4.

Behandlingstid:
Fortsätt behandlingen 2 - 3 dagar efter att symtomen försvunnit,
vanligen 1 - 2 veckor.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 1321

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-10-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT