



# Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL

(Vitamin K, Konaktion Novum)

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektionslösning 10 mg/mL (Konaktion Novum)

Injektionslösningen kan även ges oralt, se annan instruktion.

## INGEN SPÄDNING

INJ LÖ  
10 mg/mL  
1 mL

## ADMINISTRERING

Lösningen i ampullen ska vara klar. Om den är grumlig eller om fas-separation skett ska ampullen kasseras.

Intramuskulär injektion:  
-----

Intravenös injektion: minst 30 sek.

Vid reversering ges lösningen långsamt, max 1 mg/min.

Effekt ses 1 - 3 tim efter intravenös administrering.

Vid behov kan lösningen spädas med glukos 50 mg/mL eller NaCl 9 mg/mL, se annan instruktion.

## RIMLIG DOS för Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/DOS	0,05 mL	-	-	-
1 mg/DOS	-	0,1 mL	-	-
0,3 mg/kg, max 10 mg	0,03 mL	0,15 mL	0,3 mL	1 mL
1 mg/kg, max 10 mg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	1 mL

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Förebyggande av vitamin K-beroende blödning hos nyfödda

Engångsdosen bör i första hand ges intramuskulärt då intravenös administrering inte ger någon depåeffekt.

Prematurfödda med födelsevikt under 1,5 kg: engångsdos 0,5 mg (0,05 mL)

Fullgångna nyfödda samt prematurfödda med födelsevikt från 1,5 kg: engångsdos 1 mg (0,1 mL)

### Förvärvad vitamin K-brist, inkl. vid leversjukdom, neonatal kolestas samt vid massiv blödning

Ges intravenöst.

Nyfödda: 1 mg/kg

Barn 1 mån - 18 år: 1 mg/kg, max 10 mg/dos

Övergång till oral behandling enligt lokal rutin, alt. ges upprepade intravenösa doser utifrån individuellt behov.

Vid blödning ges engångsdos, som kan upprepas vid behov.

### Reversering av allvarlig blödning sekundär till warfarin/antivitamin-K behandling

Behandling bör ske i samråd med koagulationsjour.

Ges intravenöst.

Barn 1 mån - 18 år: 0,3 mg/kg, max 10 mg/DOS

Dosen kan upprepas vid behov.

## ÖVRIG INFORMATION

I produktresumén anges dosering 0,4 mg/kg (0,04 mL/kg) för prematurfödda med vikt mindre än 2,5 kg. Doseringen i denna instruktion följer "Nationella riktlinjer för vitamin K profylax" (Svenska Barnläkarföreningen/Svensk förening för Neonatologis riktlinje, se referens). Denna dosering förenklar hanteringen av de små volymerna.





## Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL

(Vitamin K, Konaktion Novum)

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Fytomenadion (registrerad produkt)

10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemp i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Bruten ampull sparas ej.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH), Hemostas vid allvarlig blödning

<https://www.ssth.se/wp-content/uploads/2020/04/Hemostas-vid-allvarlig-bl%C3%B6dning-2020-V%C3%A5rdprogram.pdf>

Micromedex

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Nationella riktlinjer för vitamin K profylax

<https://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/forlossnings-och-bb-varld-2/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#1351](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1351)

### EPED CENTRAL

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 1351

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-04-24

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**