



Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL

(ex Cyklokapron)

ADMINISTRERING

Långsam intravenös injektion: max 1 mL/min. Injiceras långsamt för att minimera risk för blodtrycksfall.

Ordinerad dos kan sättas till NaCl 9 mg/mL för att underlätta administrering.

RIMLIG DOS för Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Tranexamsyra (registrerad produkt)

100 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras vid högst 25 °C, får ej frysas. Får ej sparas, används direkt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Försiktighet vid hematuri, trombos och disseminerad intravasal koagulation (DIC). Justera dosen vid njurpåverkan.

Vid behov rekommenderas kontakt med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.

Mot blödning

Vid trauma eller preoperativt vid ex sivande blödning av oklar genes, von Willebrands sjukdom, hemofili, trombocytfunktionsdefekt och trombocytopeni.

Nyfödda: 10 mg/kg x 2 - 3. Det finns risk för ackumulering vid nedsatt njurfunktion, därav färre doseringstillfällen till nyfödda. Det förekommer dock att tranexamsyra doseras 4 gånger dagligen.

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3 - 4

Dygnsdosen skiljer sig från den i produktresuméerna.

ÖVRIG INFORMATION

Kontraindicerat vid subaraknoidalblödning samt trombos.

Läkemedel som kan förlänga blödningstid t.ex. acetylsalicylsyra och NSAID ska inte användas vid blödarsjuka, risk för ökad blödningsbenägenhet.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH), Hemostas vid allvarlig blödning

<http://www.ssth.se/lankar>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Grassin-Delyle et al. A practical tranexamic acid dosing scheme based on population pharmacokinetics in children undergoing cardiac surgery.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343649>

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL

(ex Cyklokapron)



LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1376

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 1376

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-03-31

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT