



Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 %

ögonsalva

ADMINISTRERINGSSÄTT

I nedre konjunktival-säcken:

Ta bort eventuellt sekret i ögat före administreringen. Se till att tuben inte kommer i kontakt med ögat vid administreringen, bakterier kan överföras till tuben.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Kloramfenikol (registrerad produkt)

1 %, Ögonsalva

HÅLLBAR: Öppnad tub: förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Öppnad tub: i rumstemperatur hållbar 7 dagar om användning till flera patienter, 28 dagar om användning till enskild patient.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bakteriell ögoninfektion, förebyggande av infektion efter skada, operation eller borttagande av främmande kropp

Nyfödda: 1 cm salva x 4 (- 8)

Barn 1 mån - 18 år: 1 cm salva x 4 - 8

Ges i ena eller båda ögonen beroende på indikation.

Doseringen beror på typ av infektion och svårighetsgrad. Inledningsvis används den högre doseringsfrekvensen, när symtomen lindrats kan frekvensen minskas.

Behandlingen ska pågå till 2 dygn efter symtomfrihet.

Behandlingstid: högst 10 - 14 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Kontaktlinser ska inte användas i infekterade ögon.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-09-11

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-09-11

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 1380

Versionsnummer, major: 2

Giltig fr o m: 2019-09-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT