



Klotrimazol utvärtes 1 %

(Canesten) kräm

ADMINISTRERINGSSÄTT

Utvärtes:

Krämen ska endast appliceras på de drabbade områdena av huden.

Krämen innehåller hjälpämnen som kan ge lokala hudreaktioner, lokal irritation och/eller allergiska reaktioner. Används med försiktighet i närheten av ögonen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klotrimazol (registrerad produkt)

1 %, Kräm

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Öppnad tub bör användas inom 1 mån till enskild patient och inom 1 vecka till flera patienter.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Klotrimazol kräm ska endast användas till nyfödda och barn efter bedömning av läkare.

Kutan svampinfektion

Pityriasis versicolor

Nyfödda: Appliceras tunt 2 - 3 gånger dagligen.

Barn 1 mån - 18 år: Appliceras tunt 2 - 3 gånger dagligen.

Behandlingstid: 1 - 4 veckor beroende på typ av svampinfektion

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID E H Taudorf et al. Cutaneous candidiasis - an evidence-based review of topical and systemic treatments to inform clinical practice

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31287594>

PubMed PMID S Ghosh. Neonatal pustular dermatosis: an overview.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25814724>

Rekommendation , (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-01-12

ePedID: 1385

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-01-26

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-01-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT