



Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL

(ex Extempore) oral vätska

Stor risk för förväxling. Denna instruktion gäller endast för produkter som ska användas för oral administrering.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

- Alt. 1: Extemporeberedd Kaliumklorid APL oral vätska 2 mmol/mL (sterilt tillverkad)
 Alt. 2: Addens/Addex-Kaliumklorid koncentrat till injektionsvätska 2 mmol/mL för ORAL administrering

ADMINISTRERINGSSÄTT

- Oralt:
 Bör administreras i samband med mat för att minimera irritation i mag-tarmkanalen.
 Entertalt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Addens/Addex-Kaliumklorid (från registrerad produkt)

2 mmol/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förpackning bör förvaras åtskild från andra elektrolytlösningar för att undvika förväxling. Öppnad förpackning: får ej sparas pga förväxlingsrisk.

Kaliumklorid (extempore - ej lagervara)

2 mmol/mL, Oral vätska (sterilt tillverkad)

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Hållbar 6 månader från tillverkningsdatum.
 Öppnad förpackning: hållbar 1 vecka i kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypokalemi

- Nyfödda: 0,25 - 1 mmol/kg x 2 - 4 som bör motsvara dygnsdos 1 - 2 mmol/kg/dygn
 Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 1 mmol/kg som engångsdos eller upprepade dostillfällen, vanlig dygnsdos 2 - 5 (- 8) mmol/kg/dygn

S-kaliumkoncentrationen bör utvärderas 1 - 2 timmar efter administrering.

RIMLIG DOS FÖR 2 mmol/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,25 mmol/kg	0,12 mL	0,62 mL	-	-
1 mmol/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	25 mL

REFERENS/LÄNK

- Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier
<http://www.apl.se>
 Micromedex
 Pediatric Dosage Handbook

LOKAL LÄNK

- Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1386

EPED CENTRALT

- Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-07-09 ePedID: 1386
 Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-08-21 Versionsnummer, major: 1
 Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt Giltig fr o m: 2018-08-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN Kopia ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT