



Acetylcystein rektalt 100 mg/mL

Acetylcystein lösning för nebulisator används för rektalt bruk.

EN-STEGSSPÄDNING

Acetylcystein 200 mg/mL 5 mL	+	NaCl 9 mg/mL 5 mL	=	REKTALLÖSN 100 mg/mL 10 mL
------------------------------------	---	----------------------	---	----------------------------------

ADMINISTRERINGSSÄTT

Rektalt:
Vätskan bör vara kroppsvarm vid administrering.

RIMLIG DOS för Acetylcystein rektalt 100 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mL/kg	2 mL	10 mL	-	-
5 mL/kg	5 mL	25 mL	-	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Acetylcystein (från registrerad produkt)

200 mg/mL, Lösning för nebulisator

HÅLLBAR: Öppnad injektionsflaska förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska hållbar 4 veckor vid förvaring i kylskåp.

100 mg/mL, Rektallösning

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Obstipation hos nyfödda (låg evidens, erfarenhetsbaserad behandling)

Nyfödda: 2 - 5 mL/kg x 1 - 3

REFERENS/LÄNK

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1392

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-02-03

ePedID: 1392

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2021-02-03

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-02-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT