

Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension

Instruktionen gäller för: Färdigberedd oral lösning Heracillin 50 mg/mL

Arbetsmiljö Allergisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Administreringssätt

Bäst effekt fås om doserna tas mellan måltider (minst 30 minuter före måltid).

Oralt

Enteralt i sond: suspensionen kan behöva spädas med samma volym vatten för att minska osmolariteten.

Vanlig indikation och dos

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för flukloxacillin, fr.a. infektioner i lungor, hud och/eller mjukdelar inkl. sårinfektioner

Nyfödda:

Dag 0 - 7: 25 mg/kg x 2

Dag 8 - 21: 25 mg/kg x 3

Dag 22 - 28: 25 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 10 - 17 mg/kg x 3, max 750 mg x 3

Barn över 2 år: dosen kan ökas till 20 - 33 mg/kg x 3, max 1 g x 3, vid infektioner i leder och skelett samt vid allvarliga infektioner i lungor, hud eller mjukdelar.

Behandlingstid: vanligen 7 - 10 dagar

Uppföljande peroral behandling av skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit, spondylodiskit orsakade av Staphylococcus aureus

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4, max 4 (- 6) g/dygn

Total rekommenderad behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling, i okomplicerade fall: 4 veckor

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-24 15:32:28
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-25 13:04:37
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1398
ID/spårnummer: 3600
Giltig fr o m: 2017-08-25 13:04:37
Utskriftsdatum: 2017-08-25

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension

Luftvägsinfektion vid Cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4 alt 33 mg/kg x 3, max 4,5 g/dygn

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
17 mg/kg		1,7 mL	3,4 mL	17 mL
25 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	25 mL
33 mg/kg		3,3 mL	6,6 mL	
max 1,5 g				30 mL

Hållbarhet preparat:

Flukloxacillin (ex Heracillin) (registrerad produkt)

● 50 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Beställs färdigberedd från apoteket och är hållbar 14 dygn vid förvaring i kylskåp.

Övrig information

Många upplever att suspensionen med flukloxacillin smakar illa.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan.janusinfo.se/2017/infektioner/>

Rekommendation (Grade 1B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1398

Substansspecifika uppgifter

Flucloxacillin, J01CF05

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POE1U9VI9VERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-24 15:32:28
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-25 13:04:37
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1398
ID/spårnummer: 3600
Giltig fr o m: 2017-08-25 13:04:37
Utskriftsdatum: 2017-08-25

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

