Flukloxacillin oralt 50 mg/mL

(Heracillin) oral suspension

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd oral suspension Heracillin 50 mg/mL

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Omskakas innan varje administrering.

Bäst effekt fås om doserna tas mellan måltider (minst 30 min före måltid).

Oralt

Enteralt i sond:
Suspensionen kan behöva spädas med samma volym vatten för att minska osmolaliteten.

RIMLIG DOS för Flukloxacillin oralt 50 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
17 mg/kg	-	1,7 mL	3,4 mL	17 mL
25 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	25 mL
33 mg/kg	-	3,3 mL	6,6 mL	-
max 1,5 g	-	-	-	30 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Flukloxacillin (registrerad produkt)

50 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Färdigberedd suspension är hållbar 14 dygn, ska förvaras i kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för flukloxacillin, fr.a. infektioner i lungor, hud och/eller mjukdelar inkl. sårinfektioner

Nyfödda:
Doseringsintervall beror på postnatal ålder, oavsett gestationsålder:
0 - 7 dagar: 25 mg/kg x 2
8 - 21 dagar: 25 mg/kg x 3
22 - 28 dagar: 25 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 10 - 17 mg/kg x 3, max 3 g/dygn

Dygnsdosen kan även delas upp på 4 doseringstillfällen, men detta är inte alltid praktiskt genomförbart.

Behandlingstid: vanligen 7 - 10 dagar

Allvarliga infektioner i lungor, hud eller mjukdelar
Uppföljande peroral behandling av skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit, spondylodiskit orsakade av Staphylococcus aureus

Barn 1 mån - 18 år: 25 - 33 mg/kg x 3, max 4 - 6 g/dygn

Total rekommenderad behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: minst 4 veckor

Luftvägsinfektion vid cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4 alt. 33 mg/kg x 3, max 4,5 g/dygn

Preseptal cellulit

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 3

Behandlingstid: vanligen 10 dagar

Flukloxacillin oralt 50 mg/mL

(Heracillin) oral suspension

REFERENS/LÄNK

BNF-C

http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

FASS

http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/

Internetadress VGR, Alfresco - Orbitainfektion

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/15274?/a=false&guest=true

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1398

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-12-11

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-12-11

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 1398

Versionsnummer, major: 4

Giltig fr o m: 2019-12-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT