



Flukloxacillin oralt 50 mg/mL

(Heracillin) oral suspension

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Färdigspädd oral suspension 50 mg/mL (Heracillin)

Alt. 2: Pulver till oral suspension 50 mg/mL, späds på vårdenhet

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver ska finnas för vårdenheten om alt. 2 används.

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2 Pulver till slutvolym 100 mL

Heracillin		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
1 flaska	+		=	50 mg/mL
1 st		61 mL		100 mL

Beredningsinstruktion:

Pulvret bidrar med volym, därför blir slutvolymen betydligt större än den tillsatta volymen sterilt vatten.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Skaka flaskan väl innan varje administrering.

Bäst effekt fås om doserna tas mellan måltider (minst 30 min före måltid).

Oralt

Enteralt i sond:

Suspensionen kan behöva spädas med samma volym vatten för att minska osmolaliteten.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för flukloxacillin, fr.a. infektioner i lungor, hud eller mjukdelar inkl. sårinfektioner

Nyfödda:

Doseringsintervall beror på postnatal ålder, oavsett gestationsålder:

0 - 7 dagar: 25 mg/kg x 2

8 - 21 dagar: 25 mg/kg x 3

22 - 28 dagar: 25 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 10 - 17 mg/kg x 3, max 3 g/dygn

Dygnsdosen kan även delas upp på 4 doseringstillfällen, men detta är inte alltid praktiskt genomförbart.

Behandlingstid: vanligen 7 - 10 dagar

Allvarliga infektioner i lungor, hud eller mjukdelar Uppföljande peroral behandling av skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit, spondylodiskit orsakade av Staphylococcus aureus

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4 alt. 33 mg/kg x 3, max 6 g/dygn

Total rekommenderad behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: minst 4 veckor

Luftvägsinfektion vid cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4 alt. 33 mg/kg x 3, max 4,5 g/dygn

Preseptal cellulit (infektion i vävnader runt öga)

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 3

Behandlingstid: vanligen 10 dagar





Flukloxacillin oralt 50 mg/mL

(Heracillin) oral suspension

RIMLIG DOS för Flukloxacillin oralt 50 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
17 mg/kg	-	1,7 mL	3,4 mL	17 mL
25 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	25 mL
33 mg/kg	-	3,3 mL	6,6 mL	33 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Heracillin (registrerad produkt)

1 flaska, Pulver till oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C.

50 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Färdigberedd suspension är hållbar 14 dagar i kylskåp.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Internetadress VGR, Alfresco - Orbitainfektion

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/15274?/a=false&guest=true>

Rekommendation , (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1398

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-04-21

ePedID: 1398

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-04-22

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-04-22

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT