



Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 10 mg/mL

(Celocurin)

Ska EJ ges vid hyperkalemi.

Muskelrelaxerande medel, slår ut patientens andning. Patienten ska därför vara sövd när detta läkemedel ges.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning från injektionslösning 50 mg/mL (Celocurin)

Denna instruktion lämpar sig för barn under 1 år. För äldre barn, se annan instruktion.

EN-STEGSSPÄDNING

Celocurin		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		INJ LÖ
50 mg/mL		mg/mL		
1 mL	+	4 mL	=	10 mg/mL
				5 mL

ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt med produkten, se produktinformation, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion

Intramuskulär injektion

RIMLIG DOS för Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
IV inj: 2 mg/kg	0,2 mL	1 mL	2 mL	-
IM inj: max 5 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	-

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Olika doser beroende på administreringsmetod.

Snabb muskelrelaxation

Nyfödda

IntraVenös injektion: 2 (- 3) mg/kg

IntraMuskulär injektion: 4 (- 5) mg/kg, max 150 mg

Barn 1 - 11 mån

IntraVenös injektion: 2 - 3 mg/kg

IntraMuskulär injektion: 4 - 5 mg/kg, max 150 mg

Barn 1 - 18 år: För dosering, se annan instruktion.

För lämpligt handhavande vid intubering (ex i vilken ordning som läkemedel ges), se lokal riktlinje.

ÖVRIG INFORMATION

Kan ge allvarliga bradykardier särskilt hos extremt små barn (under 500 g).

Barn behöver högre doser än vuxna pga snabbare hydrolys av succinylkolin.

Suxameton är inkompatibelt med bl.a. tiopental. I akuta situationer, då dessa läkemedel kan ges efter varandra, är det viktigt att "flusha" mellan administreringarna.

Suxametoniumklorid = succinylkoliniklorid

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnsmärtförening - Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden

<http://www.svenskbarnsmartforening.se/svenskbarnsmartforening/extern/nyfoddhetssmarta.htm>





Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 10 mg/mL

(Celocurin)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Celocurin (från registrerad produkt)

50 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Hållbar 2 mån i rumstemperatur. Bruten förpackning: Får ej sparas, används direkt.

10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1403

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-02-04

ePedID: 1403

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-02-04

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-02-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT