

Trimetoprim oralt

(ex. Idotrim)

Till följd av tablettens styrka är dessa endast lämpliga att ge till barn från ca 30 kg vid dosering 3 mg/kg. För de lägre profylaxdoserna måste Trimetoprim oral suspension användas. Denna instruktion avser båda beredningsformerna.

Arbetsmiljö Allergisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Skyddsinformation saknas i FASS, antibiotika - risk för allergi kan misstänkas

Administreringsätt

Oralt

Enteralt i sond: Den orala suspensionen går att ge i sond.

Vanlig indikation och dos

Profylax vid hydronefros

1 mg/kg x 1

Profylax vid MUC

Engångsdos 3 mg/kg

Urinvägsinfektion

3 mg/kg x 2, max 400 mg/dygn

Profylax efter urinvägsinfektion

0,5 - 1 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn

Kolangitprofylax hos patienter som Kasai opererats

0,5 - 1 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg/dos	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL
3 mg/kg/dos	0,3 mL	1,5 mL	3 mL	15 mL

Hållbarhet preparat:

Trimetoprim (Registrerad Produkt)

10 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2015-04-29 13:20:08
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-05-13 13:12:33
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1405
ID/spårnummer: 1216
Giltig fr o m: 2016-05-13 13:12:33
Utskriftsdatum: 2016-05-13

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Trimetoprim oralt

(ex. Idotrim)

Övrig information

Angiven dos för profylax efter urinvägsinfektion i denna instruktion utgår ifrån bl.a. BLF/Svensk Barnnefrologisk Förenings riktlinjer, men det förekommer högre dosering i andra källor t.ex. FASS och BNF-C.

Tabletterna går att dela, men endast för att underlätta nedsväljning dvs. båda tablethalvorna ska intas vid samma doseringstillfälle. Tillverkaren kan inte garantera lika stor halt aktiv substans i båda halvorna.

Den orala suspensionen har aprikossmak.

Referens/Länk

BNF-C Trimetoprim, Hämtat: 2015-05-06

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnfclegacy/current/PHP12838-trimethoprim.htm?q=trimethoprim&t=search&ss=text&tot=13&p=2>

FASS Trimetoprim, Hämtat: 2013-11-14

<IDE4POCIU9JV1VERT1>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Hydronefros - antenatalt diagnostiserade urinvägsavvikelser inkl. hydronefros, Hämtat: 2016-05-09

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID3A471AAD2D0690E7C1257C68002F244F?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Urinvägsinfektion hos barn, Hämtat: 2014-08-21

[http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/39EBCF51A364A37DC1257C68002C1F07/\\$File/CEKG9FLBKV.pdf](http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/39EBCF51A364A37DC1257C68002C1F07/$File/CEKG9FLBKV.pdf)

Rekommendation ,(Grade 1C), Hämtat: 2015-05-06

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Antibiotikaprofylax vid MUC, Hämtat: 2015-04-29

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/0/5986145EDF3A47C7C1257DCD004E3B7C>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Kolangitprofylax hos Kasai-opererade barn ,(Grade 2C), Hämtat: 2016-05-04

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDFSB3EF4473E744E0C1257A9F001E148D?OpenDocum>

Substansspecifika uppgifter

Trimethoprim, J01EA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POCIU9JV1VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2015-04-29 13:20:08
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-05-13 13:12:33
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1405
ID/spårnummer: 1216
Giltig fr o m: 2016-05-13 13:12:33
Utskriftsdatum: 2016-05-13

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

