

Trimetoprim oralt 10 mg/mL

(Trimetoprim Meda)

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Skyddsinformation saknas i FASS, antibiotika - risk för allergi kan misstänkas

Administreringsätt

Oralt
Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos**Profylax vid hydronefros**

1 mg/kg x 1

Profylax vid MUC

Engångsdos 3 mg/kg

Urinvägsinfektion

3 mg/kg x 2, max 400 mg/dygn

Profylax efter urinvägsinfektion

0,5 - 1 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn

Kolangitprofylax hos patienter som Kasai opererats

0,5 - 1 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn

| Rimlig dos för barn | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 1 mg/kg/dos | 0,1 mL | 0,5 mL | 1 mL | 5 mL |
| 3 mg/kg/dos | 0,3 mL | 1,5 mL | 3 mL | 15 mL |

Hållbarhet preparat:

Trimetoprim (Registrerad Produkt)

10 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

Övrig information

Angiven dos för profylax efter urinvägsinfektion i denna instruktion utgår ifrån bl.a. BLF/Svensk Barnnefrologisk Förenings riktlinjer, men det förekommer högre

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-08-09 11:12:32
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-08-19 12:05:40
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1405
ID/spårnummer: 1406
Giltig fr o m: 2016-08-19 12:05:40
Utskriftsdatum: 2016-08-19

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Trimetoprim oralt 10 mg/mL

(Trimetoprim Meda)

dosering i andra källor t.ex. FASS och BNF-C.

Den orala suspensionen har aprikossmak.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2015-05-06

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnf/legacy/current/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Handläggning urinvägsinfektion hos barn ALB, Hämtat: 2016-08-09

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDC2AF13FE73D842B9C1257F17004DC9F2?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Hydronefros - antenatalt diagnostiserade urinvägsavvikelse inkl. hydronefros, Hämtat: 2016-05-09

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID3A471AAD2D0690E7C1257C68002F244F?OpenDocument>

Rekommendation ,(Grade 1C), Hämtat: 2015-05-06

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Antibiotikaprofylax vid MUC, Hämtat: 2015-04-29

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/0/5986145EDF3A47C7C1257DCD004E3B7C>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Kolangitprofylax hos Kasai-opererade barn ,(Grade 2C), Hämtat: 2016-08-09

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDF5B3EF4473E744E0C1257A9F001E148D?OpenDocument>

Substansspecifika uppgifter

Trimethoprim, J01EA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCIU9JV1VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-08-09 11:12:32
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-08-19 12:05:40
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1405
ID/spårnummer: 1406
Giltig fr o m: 2016-08-19 12:05:40
Utskriftsdatum: 2016-08-19

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

