



Trimetoprim oralt 10 mg/mL

(Trimetoprim Meda) oral suspension

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigspädd oral suspension 10 mg/mL (Trimetoprim Meda)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Skaka flaskan väl innan varje administrering.

Oralt

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Trimetoprim oralt 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg	-	0,5 mL	1 mL	5 mL
3 mg/kg	-	1,5 mL	3 mL	15 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Trimetoprim (registrerad produkt)

10 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. För infektionskänslig patient hållbar 4 veckor efter första uttag, annars 6 veckor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Urinvägsinfektion utan feber och utan njurengagemang, efter odlingssvar

Används endast i undantagsfall till barn under 2 år, se Övrig information.

Barn 1 mån - 18 år: 3 mg/kg x 2, max 400 mg/dygn

Alternativt fast dosering:

Barn 12 - 18 år:

150 - 200 mg x 2 alt. 300 mg x 1 till natten (15 - 20 mL x 2 alt. 30 mL x 1)

Behandlingstid:

Barn under 2 år: 10 dagar

Barn 2 - 18 år: 5 dagar

Profylax efter urinvägsinfektion eller vid hydronefros

Nyfödda: 0,5 - 1 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 1 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn

Alternativt fast dosering:

Barn 12 - 18 år: 100 mg x 1

(10 mL x 1)

Profylax vid miktionsuretrocytografi (MUC/MUCG)

Barn 1 mån - 18 år: engångsdos 3 mg/kg

Kolangitprofylax efter Kasai-operation av gallvägsatresi

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 2 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn

Behandlingstid: 2 mån

ÖVRIG INFORMATION

Urinvägsinfektion hos barn under 2 år ska alltid betraktas och behandlas som pyelonefrit och för denna indikation är oftast trimetoprim inte tillräckligt eftersom effekten endast är bakteriostatisk.

Angiven dos för profylax efter urinvägsinfektion i denna instruktion utgår ifrån bl.a. BLF/Svensk Barnnefrologisk förenings riktlinjer, men det förekommer högre dosering i andra källor t.ex. FASS och BNF-C.



Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård

www.lakemedelsverket.se/uvi

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - UVI-riktlinjer

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1405

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-04-09

ePedID: 1405

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-04-14

Versionsnummer, major: 8

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-04-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT