



Trimetoprim oralt 10 mg/mL

oral suspension

INGEN SPÄDNING

ORAL SUSP
10 mg/mL
100 mL

ADMINISTRERING

Skaka flaskan innan varje administrering.

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för Trimetoprim oralt 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg	-	0,5 mL	1 mL	5 mL
3 mg/kg	-	1,5 mL	3 mL	15 mL
5 mg/kg	-	2,5 mL	5 mL	25 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Trimetoprim (registrerad produkt)

10 mg/mL, Oral suspension

Förvaras i rumstemperatur. För infektionskänslig patient hållbar 4 veckor efter första uttag, annars 6 veckor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Urinvägsinfektion utan feber och utan njurengagemang, efter odlingsvar

Används endast i undantagsfall till barn under 2 år, se Övrig information.

Barn 1 mån - 18 år: 3 mg/kg x 2, max 200 mg x 2

Alternativt fast dosering:

Barn 12 - 18 år:

160 - 200 mg x 2 alt. 300 mg x 1 till natten (16 - 20 mL x 2 alt. 30 mL x 1)

Behandlingstid:

Barn under 2 år: 10 dagar

Barn 2 - 18 år: 5 dagar

Profylax efter urinvägsinfektion eller vid hydronefros

Nyfödda: 0,5 - 1 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 1 mg/kg x 1, max 100 mg x 1

Alternativt fast dosering:

Barn 12 - 18 år: 100 mg x 1 (10 mL x 1)

Profylax vid miktionsuretrocytografi (MUC/MUCG)

Barn 1 mån - 18 år: engångsdos 3 mg/kg

Kolangit efter Kasai-operation av gallvägsatresi

Ges efter inledande intravenös behandling.

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 2 mg/kg x 1, max 100 mg x 1

Behandlingstid: 2 mån

Behandling av lindrig - måttlig Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PJP)

Endast till patienter som inte kan behandlas med trimetoprim/sulfametoxazol.

Ges i kombination med dapson, se annan instruktion.

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3

Behandlingstid: vanligen 21 dagar





Trimetoprim oralt 10 mg/mL

oral suspension

ÖVRIG INFORMATION

Urinvägsinfektion hos barn under 2 år ska alltid betraktas och behandlas som pyelonefrit och för denna indikation är oftast trimetoprim inte tillräckligt eftersom effekten endast är bakteriostatisk.

Angiven dos för profylax efter urinvägsinfektion i denna instruktion utgår ifrån bl.a. BLF/Svensk Barnnefrologisk förenings riktlinjer, men det förekommer högre dosering i andra källor t.ex. FASS och BNF-C.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

[https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-](https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/)

[material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/](https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/)

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompedium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompedium/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård

www.lakemedelsverket.se/uvi

PubMed PMID Pyrgos V et al. Pneumocystis pneumonia in children, 2009.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19879509>

PubMed PMID Siberry G K et al. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-exposed and HIV-infected children: recommendations from the National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention, the HIV Medicine Assoc

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24569199>

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - UVI-riktlinjer

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/varprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>



Trimetoprim oralt 10 mg/mL

oral suspension



LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1405

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 1405

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 9

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-02-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT