



## Dicykloverin oralt 2 mg/mL

(ex Dicyclomine licens) oral lösning

**Dicykloverin är kontraindicerat till nyfödda och spädbarn under 6 månader.**

**Förskrivare ska tydligt informera vårdnadshavarna om riskerna vid användning av dicykloverin, se Övrig information.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Oral lösning 2 mg/mL (Dicyclomine hydrochloride och Dicycloverine hydrochloride, licens)

Koncentrationen kan vara angiven som 10 mg/5 mL.

### ADMINISTRERING

Oralt: Enligt produktmonografin ges dicykloverin 15 min före maten till barn 6 - 23 mån. Till äldre barn kan det ges före eller efter mat.

Enteralt: Den orala lösningen kan spädas med vatten precis innan administrering.

### RIMLIG DOS för Dicykloverin oralt 2 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/DOS	-	2,5 mL	2,5 mL	-
10 mg/DOS	-	-	-	5 mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Dicykloverin (licensprodukt)

2 mg/mL, Oral lösning

Förvaras vid högst 25 °C. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Symtomatisk behandling av mag-tarm problem pga spasm i glattmuskulatur

Barn 6 - 23 mån: 5 - 10 mg x 3 - 4. Max 40 mg/DYGN

Barn 2 - 11 år: 10 mg x 3

Barn 12 - 18 år: 10 - 20 mg x 3

### ÖVRIG INFORMATION

Dicykloverin är inte längre ett godkänt läkemedel i Sverige. Allvarliga biverkningar har uppmärksammats, bland annat andningsuppehåll och andnöd. Det finns också fall av plötslig spädbarnsdöd där barnet fått dicykloverin, även om inget samband mellan läkemedlet och dödsfallen säkert kunnat fastställas.

Andra biverkningar som uppmärksammats efter användning av dicykloverin är övergående bradykardi med efterföljande takykardi, urinretention, pupilldilatation, muntorrhet mm.

Dicykloverin är kontraindicerat till nyfödda och spädbarn under 6 månader. Därför saknar denna instruktion indikation och doseringsangivelser för spädbarnskolik.

### REFERENS/LÄNK

ATL Barn 2004 - Extemporeläkemedel i Sverige till Barn

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Stramare regler för medel mot spädbarnskolik. Läkemedelsvärlden 2008

<https://www.lakemedelsvarlden.se/stramare-regler-for-medel-mot-spadbarnskolik/>

Micromedex

PubMed PMID Key Potentially Inappropriate Drugs in Pediatrics:  
The KIDs List

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134587/pdf/i1551-6776-25-3-175.pdf>

Rekommendation , (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Summary of Product Characteristics (SPC) Dicycloverine 10 mg/5 ml oral solution

<https://www.medicines.org.uk/emc/product/4977>



## Dicykloverin oralt 2 mg/mL

(ex Dicyclomine licens) oral lösning



### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 1445

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-07-04

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**