



Natriumklorid 9 mg/mL med heparin 1 E/mL

oklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

- Alt. 1: Färdigberedd injektionsvätska Heparin APL 1 E/mL (extempore)
 Alt. 2 - 3: Heparin 100 E/mL tillsätts till natriumklorid 9 mg/mL till slutkoncentration heparin 1 E/mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---------------|
| Heparin 100 E/mL | + | NaCl 9 mg/mL | = | INF 1 E/mL |
| 0,5 mL | | 50 mL | | 50,5 mL |

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 3

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---------------|
| Heparin 100 E/mL | + | NaCl 9 mg/mL | = | INF 1 E/mL |
| 1 mL | | 100 mL | | 101 mL |

Beredningsinstruktion:

Efter tillsats av heparin ska lösningen BLANDAS ORDENTLIGT så att den lilla volymen heparin fördelar sig i hela den totala volymen.

Infusionspåsar/flaskor i plast är överfulla. Överfyllnadsvolymen skiljer sig mellan olika tillverkare och förpackningar. Slutkoncentrationen heparin i en 100 mL påse/flaska blir därför ca 0,9 - 1 E/mL.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Kontinuerlig infusion

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Öppethållande av infart

Doseras enligt lokal riktlinje.

Exempel

Nyfödda, i perifer artärnål: 0,2 - 1 mL/tim

Barn, i artärkateter: 1 - 2 mL/tim

ÖVRIG INFORMATION

I perifer artärnål får endast NaCl 9 mg/mL alt. NaCl 4,5 mg/mL med heparintillsats ges.
 I navelartärkateter får vissa andra infusionslösningar ges.

REFERENS/LÄNK

Internetadress Alfresco, VGR - Centrala och perifera artärkatetrar

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/13752?/a=false&guest=true>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2121

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-09-04

ePedID: 2121

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-09-09

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-09-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Natriumklorid 9 mg/mL med heparin 1 E/mL oklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Natriumklorid 9 mg/mL + heparin (från registrerad produkt)

1 E/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.