



Fusidinsyra konjunktivalt 1 %

(Fucithalmic) ögonsalva/droppar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Ögonsalva 1 % (Fucithalmic)

Vid restsituation kan licensprodukt Fucithalmic ögondroppar 1 % användas. Produkterna har bedömts vara likvärdiga då både salva och droppar doseras i droppar. Styrkan på licensprodukten kan vara uttryckt som 10 mg/g.

Läkemedelsverket har gett särskilt tillstånd för receptförskrivning av licenspreparat med fusidinsyra för ögon när giltig generell licens finns, se Referens.

ADMINISTRERING

I nedre konjunktivalsäcken:

Undvik kontamination av salvan/dropparna genom att se till att tubens spets inte vidrör ögat eller annan yta.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fucithalmic (registrerad produkt)

1 %, Ögonsalva/droppar

Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad tub kan användas max 7 dagar till flera patienter och max 28 dagar till enskild patient. Gäller även licenspreparat.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Akut konjunktivit orsakad av stafylokokker

Nyfödda: 1 droppe i vardera öga x 2

Barn 1 mån - 18 år: 1 droppe i vardera öga x 2

Behandlingstid: Behandling bör ske t.o.m. 2 dagar efter symtomfrihet för att förebygga recidiv.

ÖVRIG INFORMATION

Ögonsalvan/dropparna innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation samt missfärga mjuka kontaktlinser.

Ingen typ av kontaktlinser ska användas under behandlingstiden.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Särskilt tillstånd att expediera recept på licensläkemedel vid brist

<http://tiny.cc/yfs0101>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 2122

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-03-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT