



Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL

(Doktacillin)

EN-STEGSSPÄDNING

Ampicillin		Sterilt Vatten		INJ LÖ
1 g	+		=	100 mg/mL
1 st		10 mL		10 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Ampicillin		Sterilt Vatten		INJ LÖ
2 g	+		=	100 mg/mL
1 st		20 mL		20 mL

Beredningsinstruktion:

Nyberedd lösning kan ha en gulaktig färg.

ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin, långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion:

Ges under minst 3 - 5 min. Får inte ges snabbare än 10 mg/kg/min (=0,1 mL/kg/min), dock max 100 mg/min (=1 mL/min). Ges helst i central ven då lösningen kan vara kärlretande.

RIMLIG DOS för Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
50 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	25 mL
100 mg/kg	1 mL	5 mL	10 mL	-
max 3 g	-	-	-	30 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ampicillin (registrerad produkt)

100 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: I denna koncentration hållbar 1 tim i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Systemisk bakteriell infektion med bakterier känsliga för ampicillin

Vid allvarlig infektion så som meningit eller allvarlig septisk påverkan används den högre dosen i intervallen.

Nyfödda

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 50 - 100 mg/kg x 2

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 50 - 100 mg/kg x 3

Dag 8 - 28:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 50 - 100 mg/kg x 3

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 50 - 100 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 25 - 50 - 100 mg/kg x 4 (- 6)

Maxdos:

Systemisk infektion: 1 g x 4

Allvarlig infektion: 3 g/dos, max 12 g/dygn

Behandlingstid:

Listeria sepsis: 10 - 14 dagar

Meningit: vanligen 10 - 14 dagar, vid Listeria cirka 21 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Enligt produktresumén för Doktacillin ska färdigberedda lösningar användas omedelbart. Utifrån uppgifter i andra källor har vi dock underlag för att sätta 1 timmes hållbarhet i rumstemperatur.





Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin)

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neonatal Sepsis

<https://lv.se/neonatal-sepsis>

Micromedex

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2142

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-12-18

ePedID: 2142

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-01-07

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-01-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT