



Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL

(ex Doktacillin, Ampitar)

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 1

Ampicillin		NaCl 9 mg/mL		INF
1 gram	+		=	20 mg/mL
1 st		50 mL		50 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Ampicillin		NaCl 9 mg/mL		INF
2 gram	+		=	20 mg/mL
1 st		100 mL		100 mL

Beredningsinstruktion:

Iordningställd lösning kan ha en gulaktig färg.

Ampicillin ska INTE spädas med GLUKOS 50 mg/mL pga dålig stabilitet.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner.

ADMINISTRERING

Ges helst i central ven då lösningen kan vara kärlretande.

För snabb infusion kan orsaka CNS-påverkan (ex kramper).

Intravenös infusion:

Nyfödda: minst 20 min

Barn: minst 10 - 15 min

RIMLIG DOS för Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
50 mg/kg	2,5 mL	12,5 mL	25 mL	-
75 mg/kg	3,75 mL	18,75 mL	37,5 mL	-
max 2 gram	-	-	-	100 mL
max 3 gram	-	-	-	150 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Systemisk bakteriell infektion med bakterier känsliga för ampicillin

Nyfödda

Vid allvarlig infektion så som meningit eller allvarlig septisk påverkan används den högre dosen i intervallen.

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Postnatal ålder 0 - 7 dagar:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 50 - 100 mg/kg x 2

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 50 - 100 mg/kg x 3

Postnatal ålder 8 - 28 dagar:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 50 - 100 mg/kg x 3

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 50 - 100 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år

Normaldos:

25 - 50 mg/kg x 4, max 2 gram/DOS

Högdos:

(allvarlig infektion, ex listeriameningit, samt vid mindre känsliga bakterier enligt resistensbestämning):

75 - 100 mg/kg x 4, max 2 - 3 gram/DOS

Behandlingstid:

Listeria sepsis: vanligen 10 - 14 dagar

Listeria meningit: vanligen (14 -) 21 dagar

Endokarditprofylax

Barn 1 mån - 18 år:

Engångsdos 30 - 60 min före ingrepp: 50 mg/kg, max 2 gram





Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL

(ex Doktacillin, Ampitar)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ampicillin (registrerad produkt)

1 gram, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur, gäller båda styrkorna.

20 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

I denna koncentration hållbar 8 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp, se Övrig information.

ÖVRIG INFORMATION

Enligt produktresuméerna ska färdigberedda lösningar användas omedelbart. Utifrån uppgifter i andra källor har vi dock underlag för att sätta en längre hållbarhet.

Hållbarheten för ampicillin varierar beroende på bl.a. koncentration, pH och temperatur, där en högre koncentration ger en kortare hållbarhet pga snabbare nedbrytning. Av den anledningen är det olika hållbarhetstid angiven i de olika instruktionerna för ampicillin.





Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (ex Doktacillin, Ampitar)

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress VGR, Alfresco - Endokarditprofylax på barn

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su9805-1593997-2518/surrogate/Endokarditprofylax%20p%c3%a5%20barn.pdf>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neonatal Sepsis

www.lakemedelsverket.se/neonatal-sepsis

Micromedex

NeoFax

Pediatric Injectable Drugs

PubMed PMID Hornik CP et al. Best Pharmaceuticals for Children Act—Pediatric Trials Network. Electronic Health Records and Pharmacokinetic Modeling to Assess the Relationship between Ampicillin Exposure and Seizure Risk in Neonates. *J Pediatr*. 2016
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27522443>

PubMed PMID Le J et al. Best Pharmaceuticals for Children Act – Pediatric Trials Network Steering Committee. Ampicillin dosing in premature infants for early-onset sepsis: exposure-driven efficacy, safety, and stewardship. *J Perinatol*. 2022
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35210541>

PubMed PMID Padari H et al. Ampicillin Pharmacokinetics During First Week of Life in Preterm and Term Neonates. *Pediatr Infect Dis J*. 2021
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33591074>

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) Antibiotikakompedium
<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompedium/>

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Strama Nationell Barn CNS-infektioner, barn - Meningitbehandling då odlingssvar föreligger

<https://strama-nationell.infosynk.se/category/barn>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>



Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL

(ex Doktacillin, Ampitar)



LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2143

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 2143

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-02-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT