

Läkemedel för injektion eller infusion

Dalacin, IV inj IV inf
Klindamycin 5 mg/ml
enl spädn-schema

<i>INJ/INF vätska</i>		<i>IV inj IV inf</i>
150 mg/ml		5 mg/ml
	NaCl 9mg/ml alt glukos 50 mg/ml	
2 ml	+ 58 ml	= 60 ml

Administrering: 10 till 40 min (ej över 30 mg/min)

Hållbarhet efter iordningställande: Den beredda lösningen bör användas inom 12 timmar.

Förvaras vid högst 30°C och skyddas från kyla.;

Varunummer: 437, Clindamycin ratiopharm inj-inf 150 mg/ml, 10 x 2 ml

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt lokala läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation:

Allvarliga infektioner orsakade av anaeroba bakterier.

Penicillinallergi vid öppna frakturer.

Vanlig dos: Barn 1 mån-12 år : 5-10 mg/kg x 3, maxdos
13 mg/kg x 3.

Barn 12-18 år: 150 - 675 mg x 4 , kan ökas till 1,2 g x 4 (livshotande infektioner), där enskilt given
dos ej ska överstiga 1,2 g.

Penicillinallergi vid öppna frakturer:

Engångsdos (profylax): 15 mg/kg, maxdos 600 mg

Vid behandling under 1 dygn eller mer:

10 mg/kg x 3, maxdos 600 mg x 3.

Dalacin, IV inj IV inf
Klindamycin 5 mg/ml

enl spädn-schema

Kommentar: Klistra in nedanstående länk i din webbläsare för att komma till PM:
"Antibiotikabehandling och sårrevision vid öppna frakturer på barn"

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID0D9F96F76CB4FE4DC125798A00370C60?OpenDocument>
