

Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL

(Dalacin, Clindamycin)

En-stegsspädning:	Clindamycin/Dalacin	Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9	INJ-INF LÖ
	150 mg/mL	mg/mL	5 mg/mL
	2 mL	58 mL	60 mL

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringsätt

Intravenös infusion: Minst 10 - 20 min för doser på 5 mg/kg
Minst 20 - 40 min för doser på 10 mg/kg
OBS ge ej över 30 mg/min = 6 mL/min

Vanlig indikation och dos**Allvarliga infektioner orsakade av anaeroba bakterier**

Nyfödda: 5 mg/kg x 3 (övertäg x 2 första levnadsveckan).
Läs kompletterande information under övrigt.

Barn 1 mån - 12 år : 5 - 10 mg/kg x 3, max 13 mg/kg x 3.

Barn 12 - 18 år: 150 - 675 mg x 4.

Kan ökas till 1,2 g x 4 (livshotande infektioner) och där enskilt given dos ej ska överstiga 1,2 g.

Penicillinallergi vid öppna frakturer

Engångsdos (profylax): 15 mg/kg, max 600 mg

Vid behandling under 1 dygn eller mer: 10 mg/kg x 3, max 600 mg x 3

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	1 mL	5 mL	10 mL	50 mL
10 mg/kg	2 mL	10 mL	20 mL	100 mL

Hållbarhet preparat:

Clindamycin/Dalacin (Registrerad Produkt)

● 5 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

Hållbar: Den beredda lösningen bör användas inom 12 timmar.

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-04-04 07:37:41
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-04-06 13:45:38
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2172
ID/spårnummer: 1167
Giltig fr o m: 2016-04-06 13:45:38
Utskriftsdatum: 2016-04-06

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL

(Dalacin, Clindamycin)

Övrig information

Innehåller bensylalkohol 9,45 mg/mL i injektionskoncentratet. I den färdigspädda lösningen är koncentrationen 0,3 mg/mL. Detta motsvarar bensylalkohol/dos:

5 mg/kg clindamycin = 0,3 mg/kg bensylalkohol.

10 mg/kg clindamycin = 0,6 mg/kg bensylalkohol.

Det är oklart vilka mängder som är fatalt toxiska men vid doser över 99 mg/kg/dag har gett "gaspings syndrome" hos nyfödda.

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2016-04-04

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substanceId=>

Internetadress Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om Neonatal Sepsis, Hämtat: 2016-04-04

<http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings-rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Neonatal-sepsis/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Antibiotikabehandling vid ortopedisk kirurgi och öppna frakturer på barn, Hämtat: 2016-04-04

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID0D9F96F76CB4FE4DC125798A00370C60?OpenDocument>

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2016-04-04

http://online.lexi.com/crsql/servlet/crllonline?a=doc&bc=pdh_f&mn=&id=

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2016-04-06

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaproylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt 2010, Hämtat: 2016-04-04

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecfab19/antibiotikaproylax.pdf>

Rekommendation Läkemedelsverket, Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård., Hämtat: 2014-08-21

<http://www.lakemedelsverket.se//Alla-nyheter/Nyheter-2013/Uppdaterad-broschyr-om-behandling-av-vanliga-infektioner/>

Substansspecifika uppgifter

Clindamycin, J01FF01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POEMUACAQVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-04-04 07:37:41
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-04-06 13:45:38
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2172
ID/spårnummer: 1167
Giltig fr o m: 2016-04-06 13:45:38
Utskriftsdatum: 2016-04-06

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

