



Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL

(ex Dalacin)

Alla nedanstående alternativ ger klindamycin 5 mg/mL. Välj lämplig slutvolym och iordningställ enligt instruktionerna.

EN-STEGSSPÄDNING

Klindamycin 150 mg/mL 1 mL	+	Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9 mg/mL 29 mL	=	INF 5 mg/mL 30 mL
----------------------------------	---	--	---	--------------------------------

EN-STEGSSPÄDNING

Klindamycin 150 mg/mL 4 mL	+	Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9 mg/mL 116 mL	=	INF 5 mg/mL 120 mL
----------------------------------	---	---	---	---------------------------------

EN-STEGSSPÄDNING

Klindamycin 150 mg/mL 8 mL	+	Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9 mg/mL 232 mL	=	INF 5 mg/mL 240 mL
----------------------------------	---	---	---	---------------------------------

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: Minst 10 - 20 min för doser på 5 mg/kg
Minst 20 - 40 min för doser på 10 mg/kg
OBS - ge ej över 30 mg/min = 6 mL/min

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Systemisk bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin

Nyfödda:

Läs kompletterande information under Övrig information.

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Oavsett gestationsålder vid födsel: 5 mg/kg x 3

Dag 8 - 28:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 5 mg/kg x 3

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 5 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 12 år : 5 - 10 mg/kg x 3, max 13 mg/kg x 3

Barn 12 - 18 år: 150 - 675 mg x 4

Vid livshotande infektioner kan dosen ökas upp till max 1,2 g x 4.

Infektionsprofylax och behandling vid ortopedisk kirurgi och öppna frakturer, alternativ vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:

Profylax: engångsdos 15 mg/kg, max 600 mg

Behandling under 1 - 3 dygn: 10 mg/kg x 3, max 600 mg x 3

Endokarditprofylax, alternativ vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:

15 mg/kg x 1 - 3, max 600 mg/dos. Ges under högst ett dygn.

Skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit, alternativ vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:

Initial behandling innan provsvar: 10 mg/kg x 3, max 1,8 g/dygn

Total behandlingstid, inkl. uppföljande peroral behandling, i okomplicerade fall:
4 veckor

Klindamycin har ingen effekt mot *Kingella kingae*.



Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL

(ex Dalacin)

ÖVRIG INFORMATION

Innehåller bensylalkohol 9,45 mg/mL i injektionskoncentratet. I den färdigspädda lösningen är koncentrationen 0,3 mg/mL. Detta motsvarar bensylalkohol/dos:

5 mg/kg clindamycin = 0,3 mg/kg bensylalkohol.

10 mg/kg clindamycin = 0,6 mg/kg bensylalkohol.

Det är oklart vilka mängder som är fatalt toxiska, men doser över 99 mg/kg/dag har gett "gasping syndrome" hos nyfödda.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klindamycin (registrerad produkt)

5 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Iordningställd lösning bör användas inom 12 timmar.

RIMLIG DOS FÖR 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	1 mL	5 mL	10 mL	50 mL
15 mg/kg	3 mL	15 mL	30 mL	-
max 600 mg	-	-	-	120 mL

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket, Antibiotikaprofylax i tandvården

<https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings-rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/-Antibiotikaprofylax-i-tandvarden/>

Internetadress Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om Neonatal Sepsis

<https://lv.se/neonatal-sepsis>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturoversikt 2010

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecefab19/antibiotikaprofylax.pdf>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2172

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-04-20

ePedID: 2172

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-20

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-04-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT