

Eusaprim, (vätskerestriktion)
Trimetoprim/sulfametoxazol inf lösn
enl spädn-schema

OBS Ordinationen sker i ml av ospädd infusionskoncentrat som därefter blandas. Denna spädning gäller för patienter med vätskerestriktion. Spädningen får bara göras med glukos. För spädning med NaCl 9 mg/ml hänvisas till annan instruktion.

Alt 1; 1.25 ml Eusaprim som späds vidare
Spädes från: Eusaprim konc inf lö 16mg/80mg

inf konc		glukos 50 mg/ml		inf lösn
1,25 ml	+	18,75 ml	=	20 ml

Alt 2; 2.5 ml Eusaprim som späds vidare
Spädes från: Eusaprim konc inf lö 16mg/80mg

inf konc		glukos 50 mg/ml		inf lösn
2,5 ml	+	37,5 ml	=	40 ml

Läkemedel för injektion eller infusion**Eusaprim, (vätskerestriktion)
Trimetoprim/sulfametoxazol inf lösn**

enl spädn-schema

Alt 3; 5 ml Eusaprim som späds vidare

Spädes från: Eusaprim konc inf lö 16mg/80mg

inf konc		glukos 50 mg/ml		inf lösn
5 ml	+	75 ml	=	80 ml

Alt 4; 10 ml Eusaprim som späds vidare

Spädes från: Eusaprim konc inf lö 16mg/80mg

inf konc		glukos 50 mg/ml		inf lösn
10 ml	+	150 ml	=	160 ml

Beredningsinstruktion: Varje 1 ml infusionskoncentrat ska spädas med 15 ml glukos 50 mg/ml.

Administrering: Vid denna spädning är infusionstiden max 60 minuter.

Hållbarhet efter iordningställande: anv omedelbart;

Varunummer: 415166, Eusaprim konc inf lö 16mg/80mg, 10 x 5 ml

Källa: FASS

Indikation: Systemisk bakteriell infektion, pneumocystis carinii

Vanlig dos: Ordinationen sker i ml av ospädd infusionskoncentrat som därefter blandas enligt instruktionen ovan.

Eusaprim, (vätskerestriktion)

Trimetoprim/sulfametoxazol inf lös

enl spädn-schema

Systemisk bakteriell infektion

Barn 6 veckor-5 mån: 1,25 ml morgon och kväll.

Barn 6 mån-5 år: 2,5 ml morgon och kväll.

Barn 6-12 år: 5 ml morgon och kväll.

Ovanstående barndosering motsvarar en ungefärlig mängd av 6 mg trimetoprim/kg kroppsvikt/dag och 30 mg sulfametoxazol/kg kroppsvikt/dag delad i två lika doser.

Vuxna och barn över 12 år: 2 ampuller (å 5 ml) morgon och kväll. Högsta dos är 3 ampuller (å 5 ml) EUSAPRIM morgon och kväll (maxdosen bör ej ges mer än 3 dagar i rad).

Vid sepsis kan högre doser behöva ges, motsvarande 40 mg sulfa/kg/dygn fördelat på 2 doser.

Pneumocystis carinii

0,33 ml-0,41 ml/kg x 3 (= 1-1,25 ml/kg/dygn fördelat på 3 dostillfällen)

OBS ! Ska inte ges till barn under 6 veckor.

Referens - Det blåa fältet innehåller klickbar länk till referensen

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus: Sepsis

<http://gamlainuti.karolinska.se/upload/Akutvårdsverksamheten,%20Barn/Bakteriell%20infektion.pdf>
