



Betametason oralt 0,5 mg

(ex Betapred) tablett

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletterna löses upp i lite vatten (5 - 10 mL), löses fullständigt inom 1 - 2 min.

Alternativt kan tabletterna intas utan vatten, men då ska de söndertuggas väl. Risken för lokal irritation på magslemhinnan blir dock större än vid upplösning i vatten.

Enteralt i sond: Går att ge i sond efter upplösning i lite vatten (5 - 10 mL).

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Betametason (registrerad produkt)

0,5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Fuktkänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Allergisk reaktion/anafylaxi

Barn under 6 år: 6 tabletter (3 mg)

Barn från 6 år: 10 tabletter (5 mg)

Andningsbesvär i övre- och nedre luftvägar t.ex. akut astma, viruskrupp

Barn under 10 kg: 4 - 6 tabletter (2 - 3 mg)

Barn över 10 kg: 8 (- 10) tabletter (4 (- 5) mg)

Vid långdragna/svåra besvär kan ytterligare 4 tabletter (2 mg) i 3 - (5) dagar ges.

Efter neurokirurgiskt ingrepp

Barn 1 mån - 18 år:

Dag 1 - 2: 4 tabletter x 2 (2 mg x 2)

Dag 3 - 4: 2 tabletter x 2 (1 mg x 2)

Dag 5 - 6: 1 tablett x 2 (0,5 mg x 2)

ÖVRIG INFORMATION

Vid viruskrupp är dexametason oralt ett alternativ.

Risk för systemiska biverkningar med upprepade kortkurer, särskilt om kortare än 2 månaders intervall mellan kurerna.

Internationellt används ofta dexametason istället för betametason; 0,6 mg betametason motsvarar 0,75 mg dexametason.





Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedelsbehandling vid Astma
www.lakemedelsverket.se/astma

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer
Allergi - Akut astma behandling (D9)

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer
Allergi - Anafylaxi/anafylaktisk reaktion (D1)

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2445

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-10-26

ePedID: 2445

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-11-03

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-11-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT