



# Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL

(Klyx)

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Rektallösning 120 mL resp 240 mL (Klyx)

## ADMINISTRERING

Rektalt: Kan värmas till kroppstemperatur i ett vattenbad före administrering.

Bör hållas kvar i rektum i minst 5 min före tarmtömning. För att förhindra att läkemedlet rinner ut kan barnets skinkor pressas mot varandra under någon minut.

Klyx ges med fördel med rektalsond (Nelatonkateter, Ch 10 - 14). Klipp av översta delen på "Klyxpipen" och sätt på rektalsonden. Smörj in rektalsonden med glidslem och för försiktigt in sonden i ändtarmen. Om detta inte är möjligt, för endast in del av pipen i ändtarmen till barn under 3 år.

Om mindre del än helt klyσμα ska ges rekommenderas att dra upp ordinerad mängd i enteral spruta och administrera med rektalsond.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Klyx (registrerad produkt)

Rektallösning

Förvaras vid högst 25 °C. Om del av klyσμα ges ska resten kasseras.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Obstipation

Kombineras ofta med oralt laxantia.

Till barn yngre än 1 år kan det vara mer lämpligt att använda Resulax, se annan instruktion.

Barn 1 - 5 mån: 20 - 40 mL

Barn 6 - 11 mån: 60 mL

Barn 1 - 5 år: 120 mL

Barn över 5 år: 120 - 240 mL

Behandling av förstoppning inleds med Klyx som engångsdos, kan upprepas efter ett dygn vid behov.

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Att ge Klyx med hjälp av nelatonkateter (info från Ferring)

[https://www.ferring.se/media/1265/klyx\\_broschyr.pdf](https://www.ferring.se/media/1265/klyx_broschyr.pdf)

Internetadress Handläggning Akut buksmärta hos barn

<http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Barn-och-ungdomar/Akut-buksmarta/>

Internetadress Region Skåne - Riktlinje för primärvården, Förstoppning hos barn

<https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/medicinska-omraden/barn-och-ungdom/ako/forstoppning-hos-barn/>

Internetadress Rekommenderade läkemedel för barn - bakgrundsmaterial.

Läkemedelskommittéerna i Uppsala - Örebroregionen (7 landsting)

<https://region uppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/sarskilda-patientgrupper/barn-och-lakemedel/>

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Förstoppning

<https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/buk--oversikt/forstoppning/>

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>





# Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL

(Klyx)

---

## LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2464](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2464)

---

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 2464

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-10-20

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**