



Hydrokortison kutant 1 %

(ex Mildison Lipid) kräm/salva

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kräm 1 % (ex Mildison Lipid)
Salva 1 % (ex Hydrokortison Evolan)

1 g kräm/salva innehåller 10 mg hydrokortison.

ADMINISTRERING

Kutant: Behandlingen bör kombineras med mjukgörande kräm.
Vänta minst 2 timmar mellan applikation av hydrokortison och mjukgörande kräm.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

.Hydrokortison (registrerad produkt)

1 %, Kräm

Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad tub bör användas inom 6 mån. Vid användning till flera patienter bör kortare hållbarhetstid övervägas.

Hydrokortison (registrerad produkt)

1 %, Salva

Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad tub bör förvaras i kylskåp och förbrukas inom 1 vecka. Vid användning till flera patienter bör kortare hållbarhetstid övervägas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Eksem

Barn 1 mån - 18 år: Appliceras vanligen 1 gång dagligen tills utläkning, därefter kan antalet appliceringar minskas till 2 gånger i veckan i ytterligare några veckor för att minska risken för återfall.

Behandlingen bör kombineras med mjukgörande kräm.

Extravasering av cytostatika

Barn 1 mån - 18 år:

Appliceras på det drabbade området var 6:e timme i upp till 7 dagar, eller tills förbättring, för att minska den lokala inflammationen.

ÖVRIG INFORMATION

Hydrokortison är en mild verkande kortikosteroid (grupp I) som kan sättas ut utan nedtrappning.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Janusinfo: Nedtrappning av lokala glukokortikoider (2025-09-10)

<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/hudochkonssjukdomar>

Läkemedelsverket Atopisk dermatit, behandlingsrekommendation.

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/atopisk-dermatit>

NOPHO protokoll Guideline for Prevention and Management of Chemotherapy-induced Extravasation in Children and Adolescents during Cancer Treatment.

<http://www.nopho.net>

PubMed PMID Treating extravasation injuries in infants and young children: a scoping review and survey of UK NHS practice

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30616600>

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>



Hydrokortison kutant 1 % (ex Mildison Lipid) kräm/salva



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa Akkawi El-Edelbi

ePedID: 2474

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-12-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT