



Klindamycin oralt 15 mg/mL

(Dalacin) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Färdigspädd oral lösning 15 mg/mL (Dalacin)

Alt. 2: Granulat till oral lösning Dalacin 15 mg/mL, späds på vårdenhet

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver/granulat ska finnas för vårdenheten om alt. 2 används.

INGEN SPÄDNING

Alt. 1 Färdigspädd från apotek

ORAL LÖSN
15 mg/mL
80 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Klindamycin		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
15 mg/mL	+		=	15 mg/mL
1 flaska		60 mL		80 mL

Beredningsinstruktion:

Vänd flaskan några gånger innan vattnet tillsätts för att lösgöra granulatet.

Granulatet bidrar med volym vilket gör att slutvolymen blir 80 mL.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Långvarig eller upprepad kontakt kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner.

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för Klindamycin oralt 15 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	0,33 mL	1,67 mL	3,33 mL	16,67 mL
15 mg/kg	-	5 mL	10 mL	-
max 600 mg	-	-	-	40 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin

Nyfödda

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Postnatal ålder 0 - 7 dagar:

Oavsett gestationsålder vid födsel: 5 mg/kg x 3

Postnatal ålder 8 - 28 dagar:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 5 mg/kg x 3

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 5 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3 - 4, max 1,8 gram/DYGN

Vid allvarliga infektioner bör intravenös behandling övervägas.

Akut streptokocktonsillit, vid recidiv inom 4 veckor samt vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/DYGN

Behandlingstid: 10 dagar

Endokarditprofylax, vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:

Engångsdos 30 - 60 min före ingrepp: 15 mg/kg, max 600 mg

Impetigo, sårinfektioner, erysipelas, stjärtfluss, preseptal cellulit; vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/DYGN

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

Uppföljande peroral behandling vid skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit, dock ej vid infektion orsakad av Kingella kingae eller Haemophilus influenzae. Alternativ vid penicillinallergi.

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 900 mg/DYGN

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: minst 4 veckor



Klindamycin oralt 15 mg/mL

(Dalacin) oral lösning

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klindamycin (registrerad produkt)

15 mg/mL, Granulat till oral lösning

Förvaras i rumstemperatur.

15 mg/mL, Oral lösning

Färdigspädd lösning är hållbar i 2 veckor. Förvaras i rumstemperatur.

REFERENS/LÄNK

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<https://klokalistan.se/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neonatal Sepsis

www.lakemedelsverket.se/neonatal-sepsis

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt 2010

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecefab19/antibiotikaprofylax.pdf>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2573

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 2573

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-05-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT