



Acetylsalicylsyra oralt

(ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 75 mg (ex Trombyl)
Extemporekapsel med valfri styrka

ADMINISTRERING

I produktresuméerna för godkända tabletter saknas information om delbarhet, men efter farmaceutisk bedömning kan tabletterna (oberoende av tillverkare) delas i två lika stora doser. Vid behov av andra styrkor välj extemporekapslar.

Oralt

Enteralt: Acetylsalicylsyra löser sig dåligt i vatten (ca 3 mg/mL vid 25 °C). Delmängd bör inte ges på grund av dålig dosnoggrannhet.

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering. Extemporekapslarna kan öppnas och innehållet slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering. I båda fallen finns dock risk för oklusion, framförallt i de minsta sönerna.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

. Acetylsalicylsyra (registrerad produkt)

75 mg, Tablett

Förvaras vid högst 25 °C. För Acetylsalicylsyra G.L. Pharma anges förvaring i originalförpackningen, fuktkänsligt.

Acetylsalicylsyra (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur, gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Trombosprofylax efter levertransplantation

Barn under 10 kg: 37,5 mg VARANNAN dag
Barn 10 - 30 kg: 37,5 mg x 1
Barn över 30 kg: 75 mg x 1

Behandlingstid: 6 - 12 mån efter transplantationen

Trombosprofylax efter hjärtoperation

Barn 1 mån - 18 år: 3 - 5 mg/kg x 1, max 75 mg x 1

Behandlingstid: individuell utifrån typ av operation och riskfaktorer

Trombosprofylax vid Kawasaki sjukdom eller Covid-associerad hyperinflammation

Barn 1 mån - 18 år: 2 - 5 mg/kg x 1

Behandlingstid: vanligen 6 - 8 veckor, sedan utsättning eller fortsatt behandling beroende på resultat från ekokardiografi (UCG)

ÖVRIG INFORMATION

Om patienten behandlas med heparininfusion ska behandlingen med acetylsalicylsyra påbörjas efter infusionen har avslutats.

Den individuella effekten av acetylsalicylsyra monitoreras via ASPI-test (Multiplate) som tas 5 tim efter given dos.





Acetylsalicylsyra oralt

(ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar

REFERENS/LÄNK

Artikel Alexandra V. R et al. Subdivision of aspirin tablets? Use your hands: a study on aspirin tablet subdivision using four different methods. Journal of Pharmacy Practice and Research. Feb 2018.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jppr.1338>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress The Royal Children's Hospital. Clinical Practice Guidelines: Kawasaki Disease. Melbourne VIC: The Royal Children's Hospital, 2007.

http://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Kawasaki_Disease_Guideline/.

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Brustugun J. et al. Adjusting the dose in paediatric care by dispersing fragments of four different aspirin tablets. Acta Paediatr. 2020 Feb.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32034802>

PubMed PMID Frederic D et al. Aspirin Dose and Prevention of Coronary Abnormalities in Kawasaki Disease. Pediatrics, 2007.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28562282>

PubMed PMID Xinyi Jia, et al. What dose of aspirin should be used in the initial treatment of Kawasaki disease? A meta-analysis. Rheumatology (Oxford). 2020 Aug.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32159800>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnreumatologisk Förening - Kawasakis sjukdom

<http://reuma.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2656

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Nivin Asinger

ePedID: 2656

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-10-01

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT