



# Acetylsalicylsyra oralt

(ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 75 mg och 160 mg (ex Trombyl)  
Extemporekapsel med valfri styrka

## ADMINISTRERING

I produktresuméerna för godkända tabletter saknas information om delbarhet, men efter farmaceutisk bedömning kan tablettarna (oberoende av tillverkare) delas i två lika stora doser. Vid behov av andra styrkor välj extemporekapslar.

Acetylsalicylsyra löser sig dåligt i vatten. Delmängd bör inte ges på grund av dålig dosnoggrannhet.

Oralt: Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering. Extemporekapslarna kan öppnas och innehållet slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering.

Enteralt: Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering. Extemporekapslarna kan öppnas och innehållet slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering. I båda fallen finns dock risk för ocklusion, framförallt i de minsta sonderna.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### . Acetylsalicylsyra (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur, gäller båda styrkorna. Acetylsalicylsyra G.L. Pharma förvaras i originalförpackningen, fuktkänsligt.

### Acetylsalicylsyra (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur, gäller alla styrkor.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Trombosprofylax efter levertransplantation

Barn under 10 kg: 37,5 mg VARANNAN dag  
Barn 10 - 30 kg: 37,5 mg x 1  
Barn över 30 kg: 75 mg x 1

Behandlingstid: 6 - 12 mån efter transplantationen

### Trombosprofylax efter hjärtoperation

Barn 1 mån - 18 år: 3 - 5 mg/kg x 1, max 75 mg x 1

Behandlingstid: individuell utifrån typ av operation och riskfaktorer

### Trombosprofylax vid Kawasaki sjukdom eller Covid-associerad hyperinflammation

Barn 1 mån - 18 år: 2 - 5 mg/kg x 1

Behandlingstid: vanligen 6 - 8 veckor, sedan utsättning eller fortsatt behandling beroende på resultat från ekokardiografi (UCG)

## ÖVRIG INFORMATION

Om patienten behandlas med heparininfusion ska behandlingen med acetylsalicylsyra påbörjas efter infusionen har avslutats.

Den individuella effekten av acetylsalicylsyra monitoreras via ASPI-test (Multiplate) som tas 5 tim efter given dos.



## Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar



### REFERENS/LÄNK

Artikel Alexandra V. R et al. Subdivision of aspirin tablets? Use your hands: a study on aspirin tablet subdivision using four different methods. Journal of Pharmacy Practice and Research. Feb 2018.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jppr.1338>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress The Royal Children's Hospital. Clinical Practice Guidelines: Kawasaki Disease. Melbourne VIC: The Royal Children's Hospital, 2007.

[http://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline\\_index/Kawasaki\\_Disease\\_Guideline/](http://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Kawasaki_Disease_Guideline/).

Micromedex

PubMed PMID Brustugun J. et al. Adjusting the dose in paediatric care by dispersing fragments of four different aspirin tablets. Acta Paediatr. 2020 Feb.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32034802>

PubMed PMID Frederic D et al. Aspirin Dose and Prevention of Coronary Abnormalities in Kawasaki Disease. Pediatrics, 2007.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28562282>

PubMed PMID Xinyi Jia, et al. What dose of aspirin should be used in the initial treatment of Kawasaki disease? A meta-analysis. Rheumatology (Oxford). 2020 Aug.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32159800>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnreumatologisk Förening - Kawasakis sjukdom

<http://reuma.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2656](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2656)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Nivin Asinger

ePedID: 2656

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2025-11-05

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**