



## Klonidin oralt

(ex Catapresan licens) tabletter

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 75, 100 och 150 mikrog (ex Catapresan licens)  
Depottabletter 0,1 och 0,2 mg (Kapvay licens)

Till små barn och vid administrering via sond rekommenderas oral lösning, se annan instruktion.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Depottabletten ska sväljas hel, får ej delas eller krossas.

Enteralt i sond: Oral lösning rekommenderas, se annan instruktion.

Vid premedicinering ges dos (40 -) 60 min innan planerad procedur.  
Maximal analgetisk effekt efter 60 - 90 min.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Klonidin (ex Catapresan) (licensprodukt)

75 mikrog, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkorna 100 och 150 mikrog.

100 mikrog, Depottablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkan 200 mikrog.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Denna instruktion lämpar sig för barn som kan svälja tabletter och väger över 25 kg.

#### Smärta

Nyfödda: 1 - 4 mikrog/kg x 4 - 6

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 3 mikrog/kg x 2 - 3 (- 6)

#### Premedicinering inför procedur

Nyfödda: 2 (- 4) mikrog/kg

Barn 1 mån - 18 år: 2 - 3 (- 4) mikrog/kg, max 150 mikrog/DOS

Vid otillräcklig effekt ges ytterligare 1,5 mikrog/kg, kan upprepas.

#### Oro, opiatabstinens

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 3 mikrog/kg x 3

#### Hypertoni

Barn 1 - 11 år: Startdos 1 - 2 mikrog/kg x 2 - 4, max 25 mikrog/kg/DYGN

Barn 12 - 18 år (fast dosering): Startdos 100 mikrog/DOS x 2

Vid behov, öka dosen stegvis, max 2,4 mg/DYGN

#### Sömnstörning vid ADHD (begränsad evidens)

Barn från 6 år och 45 kg (tablett och depottablett): Startdos 100 mikrog/DOS x 1

Dygnsdosen kan ökas var 7:e dag

Måldos 150 mikrog/DOS, max 400 mikrog/DYGN

Dygnsdosen kan fördelas på två doseringstillfällen.





## Klonidin oralt

(ex Catapresan licens) tabletter

### ÖVRIG INFORMATION

Antidot: Symtomgivande bradykardi kan behandlas med atropin.

Klonidin är kontraindicerat vid hypotension och svår bradyarytmi orsakad av sick sinus syndrome eller AV-block grad II-III.

Klonidin ska ges med försiktighet i kombination med dexmedetomidin (Dexdor) då effekten kan bli ytterligare sänkt blodtryck med kliniska symtom.

Vid utsättning av opioider bör klonidin trappas ut under 2 - 3 dygn efter det att opioidbehandling avslutats. Vanligen genom att ta bort en dos varje dygn.

### REFERENS/LÄNK

ATL Barn 2004 - Extemporeläkemedel i Sverige till Barn

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress SFBABI - Riktlinjer för smärtbehandling hos barn, Akut och postoperativ smärta

<https://sfai.se/delforeningar/sfbabi/riktlinjer/>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ADHD, 2016

<http://www.sfbup.se/vardprogram/riktlinje-adhd/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

[www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur](http://www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur)

PubMed PMID Lurbe et al. 2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27467768>

Rekommendation (Grade 2A)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn  
<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnsmärtförening - Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden

<https://svenskbarnsmartforening.se/nyfoddhetssmarta/>



## Klonidin oralt

(ex Catapresan licens) tabletter



---

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2692](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2692)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-11-16

ePedID: 2692

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-11-16

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-11-16

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**