



kloBAzam oralt 10 mg

(ex Frisium licens) tablett

ADMINISTRERING

Tabletten har brytskåra och kan delas i två lika stora doser.

Kliniskt förekommer delning av tabletten i 1/4-delar. Vid sådan hantering ska tablettdelare användas. Kvarvarande delar av tabletten ska sparas och ges till samma patient vid nästföljande doseringstillfällen.

Oralt:

Tabletten kan krossas och blandas med lite mjuk mat för att underlätta nedsväljning.

Enteralt:

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klobazam (licensprodukt)

10 mg, Tablett

Förvaras vid högst 25 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordineras av läkare med särskild kunskap om epilepsi.

Svårbehandlad epilepsi som alternativ till klonazepam

Barn 1 mån - 18 år:

Initial dos ofta ca 0,1 mg/kg x 2 med fortsatt stegvis dosökning var 5:e - 7:e dag om otillräcklig effekt.

Vanlig underhållsdos: 0,15 - 1 mg/kg x 2

Maxdos:

Barn under 2 år: max 10 mg/DYGN

Barn från 2 år: max 60 mg/DYGN

Utsättning måste ske långsamt pga risk för abstinens.

ÖVRIG INFORMATION

Klobazam finns även som oral suspension (licens), Clobazam Martindale Pharma 5 mg/5 mL.

Antidot flumazenil (f.d Lanexat). OBS - flumazenil är olämpligt att ge till patient med epilepsi/kramper då den plötsliga antagonistiska effekten i sig kan orsaka kramper.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

NeoFax

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) Frisium tablett 10 mg

Summary of Product Characteristics (SPC) Urbanyl tablett 10 mg

UpToDate

<http://www.uptodate.com>



kloBAzam oralt 10 mg

(ex Frisium licens) tablett



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 2705

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-10-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT