



## leveTIRacetam oralt

(ex Keppra) tabletter

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Filmdragerad tablett 250, 500, 750 och 1000 mg (ex Keppra)

### ADMINISTRERING

De flesta tabletter kan delas för att ge halv dos, undantag är Levetiracetam Actavis (tablettarna saknar brytskåra) samt Levetiracetam STADA 750 mg och 1000 mg och Levetiracetam Teva som endast kan delas för att underlätta nedsväljning.

#### Oralt:

Delad tablett kan ge en bitter eftersmak. Vid sväljsvårigheter kan tablettarna krossas och blandas med lite mjuk mat eller slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

#### Enteralt:

Oral lösning rekommenderas i första hand, se annan instruktion. Tablettarna kan dock krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Levetiracetam (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor och fabrikat.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vid nedsatt njurfunktion kan dosanpassning krävas.

#### Epilepsi

Behandling bör ske i samråd med barnneurolog.

Barn 1 mån - 18 år:

Initial dos: 5 - 10 mg/kg x 2

Därefter försiktig upptitrering av dosen till klinisk effekt med observation på psykiska biverkningar.

Vanlig underhållsdos: 10 - 20 mg/kg x 2, men doser upp till 30 mg/kg x 2 kan förekomma. Max 1500 mg x 2.

#### Krampprofylax i samband med busulfankonditionering

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 2, max 1000 mg x 2

Behandlingen påbörjas kvällen innan första busulfan-dagen och avslutas 48 timmar efter sista dosen busulfan.

### ÖVRIG INFORMATION

Vid receptförskrivning är de olika fabrikaten av tabletter inte utbytbara med varandra enligt Läke-medelsverkets beslut.

Vid övergång mellan oral och intravenös behandling ges samma dos.





## leveTIRacetam oralt

(ex Keppra) tabletter

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid epilepsi

[www.lakemedelsverket.se/behandling-epilepsi](http://www.lakemedelsverket.se/behandling-epilepsi)

Micromedex

PubMed PMID Hughes K et al. Comparison of levetiracetam versus phenytoin/fosphenytoin for busulfan seizure prophylaxis at a pediatric institution

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33894096>

PubMed PMID Tsujimoto SI et al. Comparison of clonazepam and levetiracetam in children for prevention of busulfan-induced seizure in hematopoietic stem cell transplantation

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31863341>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Neuropediatrik Förening - Epilepsi hos barn och ungdomar - Handlägningsstöd

<https://snpf.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén

ePedID: 2713

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2025-02-10

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**