



## Sorbitol rektalt

(Resulax)

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Rektalt: Till barn under 3 år ska bara halva spetsen föras in i ändtarmen.  
Förslutningsringen träs därför över tubspetsen som stopp och spetsen förs därefter in så långt det går.

Dra ut tuben fortfarande ihopklämd.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Resulax (registrerad produkt)

8,5 g, Rektallösning

HÅLLBAR: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Obstipation

Kombineras ofta med oralt laxantia.

Barn under 1 år: 1 klysmå x 1 ges 1 - 3 ggr/vecka

Barn över 1 år: 1 klysmå x 1 ges 1 - 4 ggr/vecka

Alternativt var 3:e dag tills egen tarmtömning kommit igång igen.

Till barn under 3 år ska bara halva tubspetsen stoppas in i ändtarmen.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Riktlinje för primärvården, Förstoppning hos barn

<https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/medicinska-omraden/barn-och-ungdom/ako/forstoppning-hos-barn/>

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Förstoppning

<https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/buk/forstoppning/>

Rekommendation ,(Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2752](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2752)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-01-22

ePedID: 2752

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-01-22

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-01-22

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**