



## Sorbitol rektalt 8,5 gram

(Resulax)

### ADMINISTRERING

Rektalt: Till barn under 3 år ska bara halva spetsen föras in i ändtarmen.  
Förslutningsringen träs därför över tubspetsen som stopp och spetsen förs därefter in så långt det går.

Dra ut tuben fortfarande ihopklämd.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Resulax (registrerad produkt)

8,5 g, Rektallösning

Förvaras i rumstemperatur.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Obstipation

Kombineras ofta med oralt laxantia.

Barn 1 - 18 år: 1 klysmå, kan upprepas vid behov tills egen tarmtömning kommit igång igen.

Kan ges till barn under 1 år efter läkarrekommendation.

Till barn under 3 år ska bara halva tubspetsen föras in i ändtarmen.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Förstopning

<https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/buk--oversikt/forstopning/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2752](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2752)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 2752

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-10-20

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**