



Sorbitol rektalt 8,5 gram

(Resulax)

INGEN SPÄDNING

REKTALLÖSN

8,5 g

10 mL

ADMINISTRERING

Rektalt:

Bör värmas till kroppstemperatur i ett vattenbad före administrering. Använd rikligt med glidslem eller vitt vaselin.

Till barn under 3 år ska bara halva spetsen föras in i ändtarmen. Förslutningsring används då och träs över tubspetsen som stopp. Spetsen förs därefter in så långt det går.

Dra ut tuben fortfarande ihopklämd.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Resulax (registrerad produkt)

8,5 g, Rektallösning

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Obstipation

Ges ofta som tilläggsbehandling till oralt laxantia.

Till nyfödda rekommenderas i första hand rektalt natriumklorid, se annan instruktion.

Barn 1 mån - 18 år: 1 klysma (10 mL)

Till barn under 3 år ska bara halva tubspetsen föras in i ändtarmen, se Administrering.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Förstopning

<https://www.rikshandboken-bhv.se/pedatrik/buk---oversikt/forstopning/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Funktionell obstipation hos barn och ungdomar. Nationellt vårdprogram

<https://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 2752

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-07-01

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT