



Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL

(ex Tavegyl licens)

Ska inte ges till barn under 1 år.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektionsvätska 1 mg/mL (licens).
Styrkan kan också vara uttryckt som 2 mg/ 2 mL.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: under 2 - 3 min.

Om behov av större volym kan injektionslösningen spädas vidare med NaCl 9 mg/mL
alternativt glukos 50 mg/mL.

Intramuskulär injektion:
Kan även ges intramuskulärt vid anafylaxi.

RIMLIG DOS för Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,02 mg/kg	-	-	0,2 mL	1 mL
0,05 mg/kg	-	-	0,5 mL	2,5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Tavegyl (registrerad produkt)

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Brytampull, får ej sparas efter första uttag.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Svåra fall av anafylaxi

Ska inte användas i det akuta skedet utan möjligen vid kvarstående urtikaria hos stabiliserad patient och i första hand peroralt.

Barn över 1 år: 0,05 mg/kg, max 2 mg/dygn (50 mikrog/kg)

Stödjande behandling vid allogen stamcellstransplantation samt före start av tymoglobulinbehandling

Barn över 1 år: 0,04 - 0,05 mg/kg, max 2 mg (40 - 50 mikrog/kg)

Klåda

Vid uttalad klåda där förstahandsalternativ inte gett tillräcklig effekt kan klemastin provas.

Barn över 1 år: 0,02 - 0,05 mg/kg, max 2 mg (20 - 50 mikrog/kg)

ÖVRIG INFORMATION

Klemastin är en substans med bristande evidens och tveksam säkerhetsprofil, speciellt vid användning till barn. Det finns dock inte någon annan intravenös antihistamin så vid svåra fall av anafylaxi förekommer behandling med klemastin.

Tavegyl injektionsvätska innehåller 70 mg etanol per mL.





Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL

(ex Tavegyl licens)

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress Gottberg L. Nyheter i de svenska behandlingsriktlinjerna för anafylaxi. 2015

https://www.naaf.no/globalassets/allergi-i-praxis/3---2015/sider-fra-aip_3-gottberg_anafylaxi_nya_behandlingsriktlinjar.pdf

Internetadress Läkartidningen - Gottberg L, Ta bort Tavegyl 2012

<https://lakartidningen.se/debatt-och-brev/2012/08/ta-bort-tavegyl/>

Internetadress Läkartidningen - Personne M et al, Uppdaterade riktlinjer för behandling av huggormsbett. 2017

<http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Rapport/2017/06/Uppdaterade-riktlinjer-for-behandling-av-huggormsbett/>

Internetadress Läkartidningen - Wickström E, Dokumentation för akutbehandling med klemastin (Tavegyl) saknas 2009

https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldWebArticlePdf/1/12435/LKT0930s1909_1909.pdf

Internetadress Svenska Föreningen för Allergologi - Anafylaxi

<https://www.sffa.nu/dokument/>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2763

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-09-03

ePedID: 2763

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-09-08

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-09-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT