



Proklorperazin intravenös inj 1 mg/mL

(ex Stemetil licens)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Spädning från injektionslösning 5 mg/mL (Prochlorperazine Edisylate licens)

Kan även vara märkt 10 mg/2 mL.

Alt. 2: Spädning från injektionslösning 12,5 mg/mL (Stemetil licens)

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 1: Spädning från 5 mg/mL

Proklorperazin	NaCl 9 mg/mL		INJ LÖ
5 mg/mL		+	= 1 mg/mL
2 mL	8 mL		10 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2: Spädning från 12,5 mg/mL

Proklorperazin	NaCl 9 mg/mL		INJ LÖ
12,5 mg/mL		+	= 1 mg/mL
1 mL	11,5 mL		12,5 mL

ADMINISTRERING

Intravenös injektion: max 2,5 mg/min = 2,5 mL/min

RIMLIG DOS för Proklorperazin intravenös inj 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,05 mg/kg	-	-	0,5 mL	2,5 mL
0,1 mg/kg	-	-	1 mL	5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Proklorperazin (licensprodukt)

12,5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen, ljuskänslig.

5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen, ljuskänslig.

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: 24 tim i kylskåp, 12 tim rumstemp, ljusskyddas. Lösningen missfärgas vid exponering för ljus. Missfärgad lösning ska kasseras.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax och behandling av illamående

Rekommenderas inte till barn under 2 år eller 10 kg.

Barn 2 - 18 år:

0,03 - 0,05 (- 0,1) mg/kg x 3 vilket motsvarar 30 - 50 (- 100) MIKROG/kg x 3

Denna dos är lägre än den i andra källor, men studier och erfarenhet har visat att lägre dos ofta är tillräckligt för antiemetisk effekt.

ÖVRIG INFORMATION

Använd lägsta möjliga dos till pediatrika patienter för att minska incidensen av extrapyramidala reaktioner och dystoniska biverkningar.

I produktresumén för Stemetil finns uppgifter om att proklorperazin kan ge ökad risk för fotosensitivitet, förlänga QT-tiden och att preparatet ska undvikas till patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Vi har dock inte kunnat bekräfta något av detta i andra källor.





Proklorperazin intravenös inj 1 mg/mL

(ex Stemetil licens)

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

PubMed PMID Jenkins G. Review of Dopamine Antagonists for Nausea and Vomiting in Palliative Care Patients. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2024

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37843383>

PubMed PMID Ouellette L et al. Safety and effectiveness of intravenous prochlorperazine for intractable vomiting in children with gastroenteritis. 2019

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31005395>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) Prochlorperazine edisylate injection 5 mg/mL

Summary of Product Characteristics (SPC) Stemetil injection 12.5 mg/mL

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 2824

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-12-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT