

Levobupivakain 2,5 mg/mL

(Chirocaine) sårkateter



Får INTE ges intravenöst.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Sårkateter infusion: bolus

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Levobupivakain (registrerad produkt)

2,5 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Bruten förpackning: Får ej sparas, används direkt. Hållbar 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Postoperativ smärtlindring vid bentransplantation

Barn 1 mån - 18 år: 7,5 - 10 mg x 4 (- 6) (motsvarar 3 - 4 mL x 4 (- 6))

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens

Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2833

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-12-28

ePedID: 2833

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-01-23

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-01-23

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT