



Levobupivakain 2,5 mg/mL

(fd Chirocaine, licens) sårkateter

Får INTE ges intravenöst (intravasalt).

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Levobupivakain infusionsvätska 2,5 mg/mL

(ex Levobupivacaine Fresenius Kabi, licens)

Alt. 2: Spädning från Levobupivakain infusionsvätska 5 mg/mL

(ex Levobupivacaine Fresenius Kabi, licens)

INGEN SPÄDNING

Alt. 1

INF
2,5 mg/mL
flera volymer finns

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Levobupivakain		NaCl 9 mg/mL		INF
5 mg/mL				2,5 mg/mL
50 mL	+	50 mL	=	100 mL

ADMINISTRERING

Sårkateter: bolusdos

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Levobupivakain (licensprodukt)

5 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Bruten förpackning: Får ej sparas, används direkt.

2,5 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Bruten förpackning: Får ej sparas, används direkt.

Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska endast ordineras av läkare med god kännedom om komplikationsrisker, övervakning och säkerhetsåtgärder. Följ lokal rutin.

Postoperativ smärtlindring vid bentransplantation

Barn 1 mån - 18 år: 5 - 10 mg x 4 (- 6) (2 - 4 mL x 4 (- 6))

ÖVRIG INFORMATION

Levobupivakain har (liksom ropivakain) längre effektduration och något längre anslagstid än många andra lokalanestesimedel. Vid behov av mer snabbverkande/kortverkande lokalanestesimedel är lidokain att föredra.

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2833

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 2833

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-01-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT