



## Loratadin oralt 10 mg

(ex Clarityn) tablett

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Munsönderfallande tablett 10 mg (ex Loratadin Sandoz)

Tablett 10 mg (ex Clarityn)

Vid doser under 10 mg och vid administrering via sond rekommenderas oral sirap, se annan instruktion.

### ADMINISTRERING

Effekten kommer efter ca 30 - 45 min.

Oralt: Tabletten kan delas i två delar för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge mindre dos.

Munsönderfallande tabletter kan tas utan vatten och är bra i akuta situationer eller till barn som inte kan svälja vanliga tabletter.

Enteralt: användning av oral sirap rekommenderas, se annan instruktion.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Loratadin (registrerad produkt)

10 mg, Tablett

Förvaras i rumstemperatur.

10 mg, Munsönderfallande tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Begränsad allergisk reaktion eller anafylaxi, grad 1

Då dessa doser är dubbelt så höga, och åldersintervallen lägre mot de i produktresumén angivna bör recept markeras med OBS.

Barn 1 - 23 mån: 5 mg

Barn 2 - 18 år:

under 30 kg: 10 mg

från 30 kg: 20 mg

#### Symtomatisk behandling av allergi (rinit, urtikaria)

Barn 1 - 23 mån: 2,5 mg x 1

Barn 2 - 18 år:

under 30 kg: 5 mg x 1

från 30 kg: 10 mg x 1

#### Kronisk idiopatisk urtikaria

Barn 1 - 23 mån: 2,5 mg x 1

Barn 2 - 18 år:

under 30 kg: 5 mg x 1

från 30 kg: 10 mg x 1

Dosen ovan kan behöva höjas, undantagsvis ända upp till 3 - 4 gånger.

Kontakt med barnallergispecialist rekommenderas i dessa fall.

### ÖVRIG INFORMATION

Dosreducera vid allvarligt nedsatt leverfunktion.



## Loratadin oralt 10 mg

(ex Clarityn) tablett



### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi - Urtikaria och angioödem

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2863](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2863)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 2863

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2026-01-20

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**