



Tiopental intravenös inj 10 mg/mL

(ex Pentocur), barn under 10 kg

Ordineras av anesthesi/narkosläkare.

TVÅ-STEGSSPÄDNING

Steg 1

Tiopental		NaCl 9 mg/mL		Stamlösning
500 mg	+		=	25 mg/mL
1 st		20 mL		20 mL

Steg 2

Stamlösning		NaCl 9 mg/mL		INJ
25 mg/mL	+		=	10 mg/mL
4 mL		6 mL		10 mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: Snabb 10-15 sek

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Tiopental (registrerad produkt)

25 mg/mL, Stamlösning

HÅLLBAR: Får ej sparas pga förväxlingsrisk

10 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

HÅLLBAR: Färdigberedd lösning hållbar 12 tim i rumstemperatur och 24 tim kyl.

Använd endast klar lösning.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Induktion anesthesi

Doserna nedan är vägledande, anpassas individuellt.

Nyfödda 3 - 4 mg/kg sedan 1 mg/kg vid behov

Spädbarn 5 - 8 mg/kg sedan 1 mg/kg vid behov

Barn 5 - 6 mg/kg sedan 1 mg/kg vid behov

Status epileptikus

Initialt 2 mg/kg därefter individuell titrering till effekt.

Max dos 5 (- 10) mg/kg/tim.

Behåll effektiv dos minst 2 tim, försök därefter minska med intervall på 2 - 6 tim.

RIMLIG DOS FÖR 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mg/kg	0,2 mL	1 mL	2 mL	-
8 mg/kg	0,8 mL	4 mL	8 mL	-
5 mg/kg/tim	0,5 mL/tim	2,5 mL/tim	5 mL/tim	-

ÖVRIG INFORMATION

Pentocur är registrerat preparat och ersätter licenspreparat med tiopental.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

VERSIONSHANtering

http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_2870.html

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2017-06-05 14:42:05

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-19 15:30:51

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 2870

Versionsnummer, major: 2

Giltig fr o m: 2017-06-19 15:30:51