



Uppvätskning: Underhåll 24 tim, enteralt i sond

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Vätskebehandling underhåll, efter den akuta uppvätskningsfasen.

Barn under 6 mån: bröstmjök/bröstmjölsersättning.

Barn från 6 mån: majsavling alternativt allergivänligt alternativ.

Kan vid behov blandas med vätskeersättning.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Enteralt i sond: Doserna är beräknade utifrån 24 tim, men faktisk administrationstid beror på patientens tillstånd.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Sonduppvätskning vid dehydrering hos barn med infektiös gastroenterit

Mängd vätska per 24 tim beräknas utifrån kroppsvikt:

0 - 6 kg: 150 mL/kg

7 - 20 kg: 6 x 150 mL + 50 mL/kg för varje kg över 6 kg

Över 20 kg: 6 x 150 mL + 14 x 50 mL + 20 mL/kg för varje kg över 20 kg

0 - 6 kg: 150 mL/kg

7 - 20 kg: 900 mL + 50 mL/kg över 6 kg

Över 20 kg: 900 mL + 700 mL + 20 mL/kg över 20 kg

Utöver detta lägg till 10 mL/kg för varje diarré.

Uträkningsexempel (utan hänsyn till ev diarré):

Vikt 12 kg: 900 mL + 6 x 50 mL = 1200 mL/24 tim

Vikt 23 kg: 900 mL + 700 mL + 3 x 20 mL = 1660 mL/24 tim

REFERENS/LÄNK

Rekommendation , (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2899

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-08-31

ePedID: 2899

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-09-29

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-09-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT