



## Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,85 + 1,5 %

(Extempore) barn ÖVER 1 år

### ADMINISTRERINGSSÄTT

I nedre konjunktival-säcken: Administrera dropparna ca 45 minuter före undersökning, se Övrig information.

Det är viktigt att ögat hålls öppet några sekunder efter administrering.

Efter administrering bör barnet skyddas från starkt ljus eftersom pupillen dilateras och barnet blir mera ljuskänsligt.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Cyklopentolat-Fenylefrin (K-droppe) 0,85 + 1,5% (extempore - ej lagervara)

1 st, Ögondroppar, lösning

HÅLLBAR: Öppnad och öppnad flaska förvaras i kylskåp, hållbar 7 dagar (vid användning till flera patienter) eller 28 dagar (vid användning till enskild patient).

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Långverkande mydriasis inför ögonbottenundersökning och refraktionering

Barn 1 - 15 år: 1 droppe i vardera ögat

### ÖVRIG INFORMATION

Av praktiska skäl kan det vara svårt att administrera ögondropparna exakt 45 minuter innan undersökningen. Baserat på när effekten av cyklopentolat och fenylefrin inträder och hur länge effekten kvarstår kan administrering ske 1,5 timme - 45 minuter innan undersökning.

### REFERENS/LÄNK

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2916](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2916)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-05-02

ePedID: 2916

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-05-08

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-05-08

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**