



Cyklopentolat + fenyleFRIN konjunktivalt 0,85 + 1,5 %

(Extempore) barn FRÅN 1 år

ADMINISTRERING

I nedre konjunktivalsäcken:
Administrera dropparna ca 45 minuter före undersökning, se Övrig information.

Det är viktigt att ögat hålls öppet några sekunder efter administrering.

Efter administrering bör barnet skyddas från starkt ljus eftersom pupillen dilateras och barnet blir mera ljuskänsligt.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Cyklopentolat + Fenylefrin (K-droppe) 0,85 + 1,5 % (extempore)

0,85 +1,5%, Ögondroppar, lösning

Öppnad och öppnad flaska förvaras i kylskåp. Öppnad flaska hållbar 7 dagar.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Långverkande mydriasis inför ögonbottenundersökning och refraktionering

Barn 1 - 15 år: 1 droppe i vardera ögat

ÖVRIG INFORMATION

Av praktiska skäl kan det vara svårt att administrera ögondropparna exakt 45 minuter innan undersökningen. Baserat på när effekten av cyklopentolat och fenylefrin inträder och hur länge effekten kvarstår kan administrering ske 90 - 45 minuter innan undersökning.

Vid hjärtsjukdom rekommenderas ögondroppar med endast cyklopentolat.

REFERENS/LÄNK

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 2916

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-08-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT