

Deferoxamin flera administrationsätt (ex Desferal)

Flera styrkor kan finnas.
Stor risk för förväxling, kontrollera styrkan noggrant.

Tillgängliga beredningsformer och spädningar

- Spädning till Desferal 100 mg/mL
<http://eped.sll.sjunet.org/eped/2927-558.pdf>
- Spädning till Desferal 10 mg/mL
<http://eped.sll.sjunet.org/eped/2927-562.pdf>

Administreringsätt

Intravenös infusion i samband med blodtransfusion eller akut järnförgiftning.
Späds då med fördel vidare i ex NaCl 9 mg/mL eller Glukos 50 mg/mL till Desferal 10 mg/mL.

Subkutan infusion (8-12 tim) med 100 mg/mL vid behandling av järnupplagring.
Behöver inte spädas vidare.

Intramuskulär injektion: Ges med styrkan 100 mg/mL.

Vanlig indikation och dos

Kelatbehandling vid sekundär hemokromatos

Dosen är vanligen 30-50 mg/kg/dygn beroende på järnbehov.

Patientens dos finns vanligen i läkemedelslistan/ journalanteckning enligt vårdplan.

Akut järnförgiftning

Konsultera giftinformationscentralen.

Initialt 15 mg/kg/tim, reduceras efter 4-5 tim (max 80 mg/kg/dygn).

Övrig information

Desferal ges till transfusionsberoende patienter, ex transfusionsbetingad hemosideros vid thalassaemia major, sideroplastisk anemi, autoimmun hemolytisk anemi.

Desferal binder fritt järn och överskottsjärn kan då utsöndras i urinen.

Exjade (deferasirox, dispergerbar tablett) och Ferriprox (desferipron, oral lösning, tablett) finns som alternativ vid ex thalassaemia major eller där Desferal är kontraindicerat.

Kontraindikationen för Desferal är "överkänslighet mot den aktiva substansen, utom i de fall där framgångsrik desensibilisering möjliggör behandling".

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2017-05-11 14:15:38
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-05-11 14:15:32
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2927
ID/spårnummer: 3207
Giltig fr o m: 2017-05-11 14:15:32
Utskriftsdatum: 2017-05-11

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Deferoxamin flera administrationsätt (ex Desferal)

Flera styrkor kan finnas.
Stor risk för förväxling, kontrollera styrkan noggrant.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2017-05-11 14:15:38
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-05-11 14:15:32
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2927
ID/spårnummer: 3207
Giltig fr o m: 2017-05-11 14:15:32
Utskriftsdatum: 2017-05-11

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

